

Pedro Scherer-Neto
Fernando Costa Straube
Eduardo Carrano
Alberto Urben-Filho

Lista das aves do Paraná



*Edição comemorativa do
“Centenário da Ornitologia no Paraná”*

Lista das aves do Paraná

1ª edição

Pedro Scherer-Neto
Fernando Costa Straube
Eduardo Carrano
Alberto Urben-Filho



HORI CONSULTORIA AMBIENTAL
Curitiba, Paraná, Brasil
Junho de 2011

© URBEN-FILHO & STRAUBE CONSULTORES S/S LTDA.



<http://www.hori.bio.br>

HORI CADERNOS TÉCNICOS n° 2

ISBN: 978-85-62546-02-0

CURITIBA, JUNHO DE 2011

Ficha catalográfica preparada por
DIONE SERIPIERRI (Museu de Zoologia, USP)

Scherer-Neto, Pedro

Lista das aves do Paraná: edição comemorativa do
“Centenário da Ornitologia do Paraná; por Pedro Scherer-
Neto; Fernando Costa Straube; Eduardo Carrano; Alberto
Urban-Filho. – Curitiba, Pr: Hori Consultoria Ambiental,
2011.

130p. (Hori Cadernos Técnicos n. 2)

ISBN: 978-85-62546-02-0

1. Aves - Paraná. 2. Paraná - Ornitologia. I. Scherer-
Neto, Pedro. II. Straube, Fernando Costa. III.
Carrano, Eduardo. IV. Urban-Filho, Alberto. V.
Título. VI. Série.

Depósito Legal na Biblioteca Nacional conforme
DECRETO N° 1825 de 20 de dezembro de 1907

Capa: Guarás (Eudocimus ruber) na Baía de Guaraqueçaba (junho de 2010)
(Foto: **MARCELO KRAUSE**)

Citação bibliográfica:

Scherer-Neto, P.; Straube, F.C.; Carrano, E. & Urban-Filho, A. 2011.
Lista das aves do Paraná. Curitiba, Hori Consultoria
Ambiental. Hori Cadernos Técnicos n° 2. 130 pp.

Dedicado a
JOSÉ CARLOS VEIGA LOPES
(1939-2010)

APRESENTAÇÃO

Em setembro de 1999, foi destacado no texto inaugural das atividades do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos¹, que seria a Região Sul a mais bem servida por listas regionais do País. Esta afirmativa se mantém. Com a publicação desta que é a quinta edição da lista estadual de aves, o Paraná desponta dentre os estados sulinos. Sob aspectos positivos, esta tradição paranaense recente, iniciada por Pedro Scherer Neto, em 1980, é de relevância mesmo para o contexto ornitológico nacional.

No Brasil, as iniciativas de organização de listas estaduais de aves principiaram em 1898, quando Hermann von Ihering (1850-1930), então diretor do Museu Paulista, sistematizou todos os registros atribuíveis a São Paulo, naquela ocasião a mais bem investigada das unidades da Federação. Nos sessenta anos seguintes as listas estaduais continuaram a ser produzidas a partir do exame de coleções de espécimes taxidermizados e de informações constantes na literatura, igualmente baseadas em coleções. O conhecimento regional da avifauna era, neste sentido, interligado ao processo de expansão das coleções seriadas de espécimes depositadas nos museus.

A primeira lista estadual a combinar dados da literatura e de museu com observações de campo, pessoais e de terceiros, foi concebida por Helmut Sick (1910-1991) em 1968, ao organizar (com L. F. Pabst) a lista de aves do agora extinto estado da Guanabara. Figuravam nessa listagem espécies com diferentes bases documentais, desde algumas bem conhecidas por muitos espécimes coletados até outras

¹ *Nattereria* no. 1, março de 2000, página 2.

jamais coletadas, mas apenas observadas alguma vez. Entretanto, sendo a lista de Sick e Pabst comentada, é possível reconhecer quais espécies teriam registros para a Guanabara (hoje correspondente aos limites do Rio de Janeiro, a capital) com base apenas em observações dos autores ou no testemunho de terceiros.

Algumas listas estaduais foram produzidas de maneira menos informativa. Eram, assim, meras relações de nomes científicos empilhados sem compromisso com registros plenamente corroborados. Tanto laconismo quanto ao formato impedia o mais elementar dos princípios científicos: a possibilidade de alguém replicar o resultado (refazer a lista!) utilizando-se dos mesmos procedimentos.

Uma tentativa de padronizar as listas estaduais, iniciada na década de 1980, sugeria o uso combinado das letras **BMC**. A primeira letra indicava que o registro da espécie era constante da **B**ibliografia, a segunda indicava ser conhecido algum espécime de **M**useu coletado no estado e a terceira indicava que havia algum registro de **C**ampo. Com o seu uso, esse sistema mostrou-se pouco informativo e gerador de ambiguidades. Estar na bibliografia, ter uma alegada pele em museu ou existir algum registro em campo pode não atestar em definitivo a ocorrência de qualquer espécie. É preciso ponderar acerca da validade desses registros caso a caso.

É possível constatar, especialmente, nas duas últimas décadas, uma preocupação com a qualidade dos registros incorporados às listas regionais. Este zelo deriva provavelmente da constatação de que as listas estariam inflacionadas pela inclusão de espécies cuja ocorrência não estaria devidamente corroborada. Afinal, listas regionais derivam do acúmulo de informações históricas e recentes e quase nunca parece óbvio se certas ocorrências são errôneas ou corretas, porém simplesmente pretéritas. Acrescente a

isto os fenômenos de expansão espontânea da distribuição, câmbio de áreas de invernagem e vagância. É inescapável que listas cresçam na medida em que o conhecimento sobre a fauna de aves melhore, porém é preciso que isso ocorra de maneira sólida e coerente.

A renovada “Lista das aves do Paraná”, comemorativa do “Centenário da Ornitologia” do estado, reúne todo esse novo espírito e propósito. O usuário poderá perceber a diligente anotação padronizada que houve em cada espécie incorporada. Reitero aqui o que já disse em outras ocasiões: este trabalho de Scherer-Neto, Straube, Carrano e Urban-Filho, que tenho a especial satisfação de apresentar, demonstra o quão complexo pode se tornar a mais elementar das tarefas no estudo de uma avifauna, a de estabelecer o conjunto das espécies ocorrentes em uma área.

JOSÉ FERNANDO PACHECO

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO)

LISTA DAS AVES DO PARANÁ

Pedro Scherer-Neto
Fernando Costa Straube
Eduardo Carrano
Alberto Urben-Filho

Há pouco mais de um século, o naturalista polonês Tadeusz Chrostowski desembarcava no Paraná, em maio de 1910, oficialmente como imigrante mas pessoalmente como cientista interessado em estudar as aves silvestres paranaenses. Deixara, afinal, sua terra natal com o firme propósito de colecionar espécimes e fazer observações sobre a nossa avifauna. Baseado nesse legado obtido com grande esforço, publicou – dois anos depois – parte de suas descobertas, naquele que seria o primeiro artigo científico versando exclusivamente sobre as aves do nosso Estado (Chrostowski, 1912).

Bem da verdade, o conhecimento sobre a composição da avifauna do Paraná é muito mais antigo. Ele se formou aos poucos, iniciando-se já no Século XVI e gradativamente foi enriquecendo com as contribuições de cronistas e naturalistas que aqui se estabeleceram, por alguns dias ou muitos anos, mencionando as aves encontradas, em certas situações transformadas em espécimes comprobatórios.

Até o ano de 1980 haviam apenas 380 espécies mencionadas para a avifauna paranaense (Straube, 2001). Esse número se alterou substancialmente, a partir de então, com o lançamento da primeira coletânea, o livro AVES DO PARANÁ (Scherer-Neto, 1980) seguido pelas edições subsequentes, todas transformadas em listas atualizadas ao longo dos tempos (Scherer-Neto, [1983], 1985; Scherer-Neto & Straube, 1995). Assim, o total de 558 espécies consignadas para 1980 subiu para 593 em 1983, 623 em 1985 e, enfim, 712 no ano de 1995. Hoje, com base no presente estudo – que sai 16 anos depois da última revisão – pode-se constatar um total de **744 espécies**, o que nos dá uma ideia muito satisfatória da riqueza de nossa fauna ornitológica.

No mesmo ano em que Chrostowski chegava ao Paraná, nascia em Leipzig (Alemanha), o naturalista Helmut Sick, um dos mais destacados ornitólogos que o Brasil já teve a honra de acolher. Autor de centenas de artigos técnicos, consagrou-se pelo clássico e indispensável livro “ORNITOLOGIA BRASILEIRA”, fonte de consulta obrigatória, dada ao lume em 1985 e reeditada em 1997, sob a cuidadosa e competente revisão de seu discípulo José Fernando Pacheco. Sick, com efeito, foi também um dos primeiros mestres que incentivou a publicação do “Aves do Paraná” de 1980, dele participando diretamente por meio de sua orientação segura ao autor, bem como da empolgação que lhe era peculiar, manifestada em suas diversas visitas que fez ao território paranaense.

Listas faunísticas são muito importantes para o avanço das ciências naturais, por se tratarem de fontes indispensáveis de subsídios a outras áreas do conhecimento como a biogeografia, a ecologia e mesmo a seus desdobramentos, como a ciência da conservação e as avaliações de impacto ambiental. De fato, todo o

conhecimento sobre a distribuição das aves brasileiras começou a ser estabelecido, ao longo da história, com o acúmulo de dados originários dos tantos estudos de natureza regional.

No entanto, todos os pesquisadores que se dedicam às constantes compilações de espécies de aves ocorrentes em determinadas regiões, experimentam alguns dissabores ligados à dinâmica natural que esse tipo de trabalho gera. Uma edição após a outra é possível verificar que, mesmo a caminho da gráfica, a lista acaba por se desatualizar rapidamente, como resultado diretamente proporcional ao número e à capacitação dos pesquisadores envolvidos nas pesquisas ornitológicas locais.

É de se lembrar que não apenas o conhecimento da composição avifaunística de uma área – natural ou política – modifica-se rapidamente, mas também o arranjo taxonômico, como consequência de estudos mais aprofundados suportados por material mais abundante e elucidativo, bem como de novas filosofias de métodos de classificação e a identificação de padrões biogeográficos.

Nesse sentido, a disponibilidade de franquear informações quase que instantaneamente pelo mecanismo *on line*, factível apenas após o advento da rede mundial de computadores (*internet*), acabou por favorecer uma nova filosofia na disseminação de informações. Fortalecidos e guiados por esse propósito é que nos empenhamos para apresentar os resultados de nossas pesquisas voltadas ao inventário da avifauna paranaense, estudo que, como dito é suscetível a atualizações constantes e, dessa forma, favorecendo um acesso muito rápido das informações colhidas em mais de três décadas de estudos, somadas às contribuições advindas da importante cooperação existente entre ornitólogos paranaenses e de outros estados brasileiros.

Essa lista, desta forma, não substitui as edições anteriores, tampouco seus méritos como fontes de referência. Serve-se – isso sim – como mais um degrau na busca pelo conhecimento da avifauna que ocorre no Estado do Paraná, agora adaptada a protocolo mínimo consensual de admissão de espécies.

A obra aqui apresentada foi construída com base no formato da “LISTA DAS AVES DO BRASIL”, compilação que é anualmente produzida e atualizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), grupo de estudos da Sociedade Brasileira de Ornitologia do qual os quatro autores são membros. Esse procedimento inclui tanto o formato e a apresentação, quanto os critérios adotados por aquele Comitê, com uma *Lista Primária* que abriga espécies com pelo menos um dos registros de ocorrência no Paraná provido de evidência documental (itens disponíveis para consulta independente, na forma exclusiva de espécime integral ou parcial, fotografia, gravação de áudio ou vídeo, que permitam a determinação e aferição segura e independente do táxon) e, por fim, uma *Lista Secundária*, que agrega espécies com ocorrência no Paraná, inclusive providas de registros específicos, mas cuja evidência documental não é conhecida ou disponível.

Também seguindo o mesmo procedimento, excluem-se aqui as espécies consideradas na chamada *Lista Terciária*, ou seja, aquelas que dispõem de registros para o Estado mas que, além de carentes quanto à evidência documental, são inválidos ou insuficientemente circunstanciados e alusivos a espécies cuja ocorrência é improvável nesta unidade de federação.

Além dos critérios adotados pelo CBRO (2011) no tocante à classificação, sequência e nomenclatura², também

² As únicas distinções feitas em confronto com essa obra foi a não adoção, aqui, das classificações de Caprimulgidae e Thraupidae e, ainda, de situações

seguimos o padrão de “nomes vernáculos técnicos” (*sensu* Farias & Alves, 2007) para os nomes em português. Cientes de que tais nomes se tratam de denominações técnicas escolhidas para individualizar cada espécie de ave brasileira com uma única designação em língua portuguesa, acreditamos que eles possuem caráter puramente instrumental, visando tão somente a comunicação com o público leigo. Por esse motivo, aparecem, nesta obra, cercados por colchetes. Por sua vez, os nomes que aparecem sem essa indicação se tratam de autênticos nomes populares (“nomes locais”, segundo Farias & Alves, 2007), colhidos pelos autores em campo ou na literatura, desde que mediante fidedignidade dos informantes e utilizados, local ou amplamente, nos limites estaduais. Essas denominações, ainda carentes de colecionamentos e pesquisas, assim como da necessária base linguística, constituem-se de nossa contribuição para o tema, visando especialmente à preservação desse patrimônio cultural de indiscutível importância.

Outra inovação aqui aplicada foi a apresentação de *FORMATO SUPERIOR DAS EVIDÊNCIAS*, ou seja, o elemento, único ou selecionado entre vários, que melhor serve como parâmetro para a inclusão de cada espécie na lista. Adotando-se a codificação sugerida por Carlos *et al.* (2010) essas evidências são preferencialmente documentos de nível A (**DA**: exemplares de museu), mas também de Nível B (**DB**: documentos replicáveis) e, invariavelmente, servem-se como lastro para a inclusão na Lista Primária. Aos elementos considerados documentais, em quaisquer níveis, estão adicionados os acrônimos institucionais onde o material se encontra depositado.

provisórias (*incertae sedis*) para alguns grupos ou espécies, para os quais utilizamos edição anterior da mesma lista (CBRO, 2009), sob a forma de arranjo o mais coerente e consensual possível.

No caso de Documentações de Nível B (DB), esses documentos podem ser associados à respectiva “REPRESENTAÇÃO” que, para fins desse estudo, alude à melhor e mais acessível maneira de acessá-las publicamente, de forma visual ou auditiva, desde que publicada de forma impressa ou disponível na *internet*. Nesse último caso, remete-se o elemento comprobatório, incluindo numeração de catálogo aos acervos virtuais que dispõem de tais informações para os propósitos deste estudo, o Wikiaves (WA: <http://www.wikiaves.com.br>) e o Xeno-canto (XC: <http://www.xeno-canto.org>).

É importante frisar que, caso o documento (de nível A ou B) não tenha sido examinado por ao menos um dos autores ou qualquer das informações a ele associadas sejam duvidosas ou incertas, ele não será consignado como tal. Tais situações ocorrem particularmente no caso de fotografias ou arquivos sonoros não-aferidos, embora alegadamente existentes em acervos privados. Exceção feita a essa regra está em espécimes de museu depositados em coleções do Exterior, às quais os autores não tiveram acesso, mas que foram positiva e indubitavelmente identificadas em artigos técnicos por avaliação de revisores habilitados; esses casos aparecem acompanhados de um asterisco.

As espécies tratadas como pertencentes à Lista Secundária, leia-se, aquelas que não dispõem de documentação para o Paraná, são citadas entre colchetes e referem-se, ainda com base em Carlos *et al.* (2010) a indicativos de constatação, publicados (ICP) ou não (ICI) tendo, neste último caso, uma descrição circunstanciada do referido registro em rodapé, em virtude de ser inédito.

Em quaisquer das situações aqui contempladas, a seleção de evidências superiores baseia-se nos três princípios fundamentais para a preparação de listas estaduais: *aferição, acessibilidade e detalhamento*. Nesse

sentido, é lícito alertar sobre a possibilidade de existirem documentos passíveis de se tornarem futuramente superiores e que se encontram em coleções ou acervos privados (notadamente fotografias e arquivos sonoros) ainda não averiguados, cuja consideração foi não-intencionalmente omitida ou por impossibilidade de acesso. O mesmo se refere a contatos visuais que por certo existem, mas, que não foram devidamente oficializados em publicação com o detalhamento necessário e desejável.

Por fim, aqui também estão incluídas indicações sobre a formalização dos registros de cada espécie, por meio de citação bibliográfica que aponta a primeira publicação que melhor resume a presença (documentada ou não) da espécie no Paraná. Essas chamadas *FONTES PRIMÁRIAS* aludem aos primeiros estudos que vislumbraram a avifauna paranaense no geral (*Obras de Referência*) ou particular (Pelzeln, 1871; Ihering & Ihering, 1907; Chrostowski, 1912; Sztolcman, 1926; Pinto, 1938, 1944; Pinto & Camargo, 1956), mas, em algumas situações, dá-se preferência a textos circunstanciados ou àqueles que trazem revisões mais profundas e detalhadas (frequentemente críticas) de situações de registro, eventualmente com aspectos distribucionais. Para essa tarefa, especificamente no caso das listas de Scherer-Neto, admitiu-se apenas as edições de 1980 e 1995 (Scherer-Neto, 1980; Scherer-Neto & Straube, 1995) e apenas agregaram-se as aves que dispunham de registros de museu (M: indicando que haveria espécime coletado) e/ou campo (C: apontando constatações pessoais dos autores no Paraná).

Em muitos casos, a seleção de uma fonte primária pode ser considerada subjetiva mas, para tanto, primou-se pela maior coerência possível com o crédito conferido aos descobridores e/ou revisores envolvidos e o detalhamento oferecido. Um dos casos que merecem cuidado alude aos

táxons cuja localidade-tipo é consignada a algum topônimo paranaense, embora esse crédito seja conferido apenas quando a localidade é mencionada explicitamente no texto original, não se acatando situações de designações posteriores.

Para algumas das espécies mencionadas na vasta literatura ornitológica paranaense (inclusive nas duas listas acima citadas), adotou-se uma posição conservativa, realizando-se a necessária exclusão de algumas (Lista Terciária), cuja revisão posterior dos detalhes de registro provou falibilidade biogeográfica, alteração nomenclatural ou carência de informações mínimas associadas.

Para o caso particular de espécies comprovada ou alegadamente introduzidas, obedeceu-se os mesmos procedimentos adotados para a avifauna autóctone. Tais representantes encontram-se incluídos à lista geral, exceto aqueles cujo registro, único ou repetido, foi considerado acidental, condição caracterizada pela impossibilidade de se comprovar mais de 10 anos de aclimação no Estado (*vide* AOU, 1983; Straube *et al.*, 2009).

A riqueza ornitológica paranaense deve ser tratada, portanto, como detentora de 684 [+ 60] espécies, em alusão às listas primária e secundária. E, por assim dizer, fica interessante tecer uma comparação com as edições anteriores da lista (para maiores detalhes *vide* Straube, 2005).

Esses valores apontam para uma conclusão convergente para o progresso das pesquisas com a avifauna paranaense, inclusive pelo incremento de registros documentados, protocolo que, nacionalmente, tem recebido atenção especial nos últimos anos. É notável, desta maneira, o aumento do número de espécies atribuído à lista primária, se confrontados os números de 1980 aos atuais. Afinal, essa riqueza mais que duplicou em pouco mais de três décadas,

mostrando que, além do registro em si, os estudiosos têm se preocupado também em agrupar provas físicas de ocorrência, seja sob a forma de exemplares de museu, seja – mais modernamente – por meio de testemunhos digitais, fotográficos ou sonoros.

*Número de espécies consideradas para as quatro edições da lista das aves do Paraná (Scherer-Neto, 1980, [1983], 1985 e Scherer-Neto & Straube, 1995) e neste estudo, de acordo com a fonte: **B**, registro bibliográfico; **M**, registro em museu; **C**, registro em campo; **LP**, riqueza equivalente ao adotado neste estudo como Lista Primária; **LS**, riqueza equivalente ao adotado neste estudo como Lista Secundária; **nc**, não considerado (Adaptado de Straube, 2005).*

FONTE	TOTAL	B	M	BM	MC	BMC	LP	C	BC	LS
Scherer-Neto (1980)	558	168	20	115	1	197	333	3	54	57
Scherer-Neto (1983)	593	173	14	70	2	251	337	2	81	83
Scherer-Neto (1985)	623	115	8	32	2	351	393	7	108	115
Scherer-Neto & Straube (1995)*	712	46	1	24	4	541	570	13	83	96
Esta edição	744	nc					684	4	56	60

*. Desconsideradas as espécies com possibilidade marginal de inclusão.

Além de novas espécies que certamente serão incorporadas a inventários futuros, há também outros desafios que se ligam à necessidade de documentação das espécies da lista secundária e também, da conscientização geral sobre a importância de se publicar novos registros, de forma circunstanciada. A verdade é que cerca de 8% da lista paranaense ainda precisa de elementos testemunhais físicos, o que deverá se intensificar nos próximos anos, suprimindo toda ou grande parte dessa demanda. Seria interessante, desta forma, concentrar esforços a grupos crípticos (p.ex.

Rallidae) ou que são flagráveis em ambientes (p.ex. aves oceânicas) ou épocas (p.ex. aves migratórias) particulares.

A documentação de espécies, outrora considerada em listas anteriores apenas pelo código M (registro em museu), agora também recebeu um incremento importante graças aos modernos recursos de coleta visual ou sonora, bem como sua ampla popularização. Ressalta-se que, da lista primária aqui computada, pouco mais de 4% das espécies são fundamentadas documentalmente apenas por fotos ou sons, disponíveis na internet ou mantidas em acervos pessoais. Muitas dessas aves são comuns no Paraná e, de uma forma geral, aguarda-se a respectiva obtenção de documento de nível A, em atenção à Recomendação nº 9 do CBRO³.

O presente trabalho, como dito, é fruto de constantes atualizações e – levando-se em conta a dinâmica à qual as avifaunas estão submetidas, associada ao constante refinamento das técnicas de documentação – provavelmente jamais ficará completo. Como um todo, ele também não é resultado exclusivo do trabalho dos quatro autores e sim agrega informações colhidas por diversos pesquisadores, observadores de aves, fotógrafos e leigos, sempre atentos às novidades e possíveis descobertas.

Nesse sentido, é necessária a expressão de nossa gratidão a várias pessoas que contribuíram com várias informações aqui incluídas. Somos inicialmente gratos a todos aqueles que já foram citados nas outras versões desta lista e que, de várias maneiras, participaram diretamente do trabalho. Além deles queremos adicionar outros nomes que, por sua vez, participaram nesta nova edição. Leonardo

³ **Recomendação Nº 9.** O CBRO recomenda a coleta de espécimes como a forma de documentação original mais adequada para registros de espécies cuja determinação taxonômica ofereça dificuldades ou seja propensa a questionamentos (CBRO, 2001b:81).

Rafael Deconto, Marcelo Alejandro Villegas Vallejos, Ricardo Krul, Raphael L.M.Sobânia, Fábio Olmos, Dimas Gianuca-Neto, Caio J.Carlos, Reinaldo Guedes, Vítor de Q.Piacentini, José Flávio Cândido-Júnior, Marina Marins, Tamara Molin, Maria Cecília Vieira-da-Rocha, Silvana Baijuk, Márcio Repenning, Luciana Chiyo, Israel Schneiberg, Ricardo Belmonte-Lopes, Érico Viensci e José Fernando Pacheco enviaram registros ou informações e participaram de algumas discussões; este último, inclusive, preparou o texto de apresentação da obra, honrando-nos com parte de sua indiscutível competência. Dione Seripierri fez, com o costumeiro capricho, a ficha catalográfica. Destaque também merece Marcelo Krause pela cessão de bela foto que aparece na capa, que recebeu os cuidados de Ismael Franz para sua diagramação final.

Os autores são também profundamente gratos aos autores de fotografias e arquivos sonoros que se constituem de única documentação de certas espécies para o Estado do Paraná, por terem autorizado a menção do valioso conteúdo: Adilson C.Constantini, Airton Garcia, Antônio Carlos Terto, Berndt Egon Marterer, Demétrio Iorin, Dimas Gianuca-Neto, Dimas Rocha, Edson Endrigo, Evandro Pereira, Fábio Olmos, Frederico Swarofsky, Leonardo Rafael Deconto, Marcelo Alejandro Villegas Vallejos, Marcelo Bonat, Márcio Kazubek, Priscila Forone, Renata Cunha, Reni Santos, Vítor de Queiroz Piacentini e Wellington Carvalho.

Destacamos, ainda, os curadores de coleções brasileiras e estrangeiras que contribuíram com informações ou permissão de acesso aos seus acervos: Márcia Arzua (Museu de História Natural Capão da Imbuia, PMC, Curitiba), Fernando A.Sedor (Museu de Ciências Naturais, UFPR, Curitiba), Luis Fábio Silveira (Museu de Zoologia, USP, São Paulo), Marcos A.Raposo (Museu Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro), Glayson A.Bencke (Museu de

Ciências Naturais, FZB, Porto Alegre), Alexandre Aleixo e Fátima Lima (Museu Paraense Emílio Goeldi, MCT-UFPA, Belém), Carla S.Fontana (Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS, Porto Alegre), David Willard (*Field Museum of Natural History*, Chicago, EUA), Thomas Trombone (*American Museum of Natural History*, Nova York, EUA) e Ernst Bauernfeind (*Naturistorisches Museum Wien*, Viena, Áustria).

CODIFICAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS

É a seguinte a terminologia e respectiva codificação aqui adotada, baseada em Carlos *et al.* (2010), entendendo-se como “evidência”, *o indício que comprova (por meio de documento) ou aponta (por meio de indicativo) a ocorrência de uma espécie em uma certa área geográfica.*

Documento: evidência material, ou conversível em um formato físico (audiovisual), que atesta a presença de uma espécie em determinada região.

Documento de Nível A (DA): o indivíduo, no todo ou seus fragmentos, perenizado sob a forma de um espécime de museu, consistindo em um documento único e não replicável.

Documento de Nível B (DB): expressão visual e/ou sonora de um indivíduo, consistindo de documento único ou múltiplo, porém replicável.

Indicativo de ocorrência: evidência(s) não subsidiada(s) por documentação.

Indicativo de ocorrência publicado (ICP): evidência que, embora não se encontre associada a documentação, apresenta-se amparada por publicação circunstanciada referente ao registro.

Indicativo de ocorrência inédito (ICI): evidência não documentada, carente de divulgação mediante detalhamento, descrição e localização.

REPRESENTAÇÃO: elemento complementar que consiste na exposição pública do documento de um ou ambos os

níveis (RDA e/ou RDB), sob a forma impressa (publicação) ou virtual (disponível na *internet*).

DOCUMENTOS DE NÍVEL A (DA)

ExD: exemplar(es) depositado(s) em coleção domiciliada no Estado do Paraná

ExB: exemplar(es) depositado(s) em coleção institucional em outro estado brasileiro

ExE: exemplar(es) depositado(s) em coleção institucional em outro país

Acervos museológicos:

MHNCI: Museu de História Natural Capão da Imbuia, Prefeitura Municipal de Curitiba (Curitiba, PR)

M7Q: Museu Sete Quedas, Prefeitura Municipal de Guaíra (Guaíra, PR)

MCNPR: Museu de Ciências Naturais, Universidade Federal do Paraná (Curitiba, PR)

MHNLTs: Museu de História Natural Prof. Luiz Trajano da Silva, FAFICOP (Cornélio Procópio, PR)

MZUEL: Museu de Zoologia, Universidade Estadual de Londrina (Londrina, PR)

MZUSP: Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo (São Paulo, SP)

MN: Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, RJ)

MCN: Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS)

FMNH: *Field Museum of Natural History* (Chicago, EUA)

AMNH: *American Museum of Natural History* (Nova York, EUA)

NMW: *Naturhistorisches Museum Wien* (Viena, Áustria)

MNB: *Museum für Naturkunde, Humboldt Universität* (Berlim, Alemanha)

MIZ: *Muzeum i Instytut Zoologii, Polskiej Akademii Nauk* (Varsóvia, Polônia).

DOCUMENTOS DE NÍVEL B (DB)

FoX: fotografia em acervo privado

AsP: arquivo sonoro em acervo privado

Acervos privados: **ACC:** Adilson C.Constantini, **AG:** Airton Garcia, **AUF:** Alberto Urben-Filho, **ACT:** Antônio Carlos Terto, **BEM:** Berndt Egon Marterer, **DI:** Demétrio Iorin, **DGN:** Dimas Gianuca-

Neto, **DR**: Dimas Rocha, **EE**: Edson Endrigo, **EC**: Eduardo Carrano, **EP**: Evandro Pereira, **FO**: Fábio Olmos, **FCS**: Fernando Costa Straube, **FS**: Frederico Swarofsky, **LRD**: Leonardo Rafael Deconto, **MAVV**: Marcelo Alejandro Villegas Vallejos, **MB**: Marcelo Bonat, **MK**: Márcio Kazubek, **PF**: Priscila Forone, **RC**: Renata Cunha, **RS**: Reni Santos, **RB-L**: Ricardo Belmonte-Lopes, **VQP**: Vitor de Queiroz Piacentini, **WC**: Wellington Carvalho.

REPRESENTAÇÕES DOCUMENTO DE NÍVEL B (RDB)

FoP: fotografia publicada

FoI: fotografia disponível na *internet*

(**WA**: Wikiaves, <http://www.wikiaves.com.br>)

AsI: arquivo sonoro disponível na *internet*

(**WA**: Wikiaves, <http://www.wikiaves.com.br>;

XC: Xeno-canto, <http://www.xeno-canto.org>.)

INDICATIVOS DE OCORRÊNCIA

ICP: indicativos de ocorrência publicados

ICI: indicativos de ocorrência inéditos (circunstanciados em nota de rodapé)

LISTA DAS AVES DO PARANÁ

STRUTHIONIFORMES	—	—
RHEIDAE	—	—

Rhea americana (Linnaeus, 1758)

[ema], ema, avestruz

DB:FoX (EC); FP:Scherer-Neto (1980)

TINAMIFORMES	—	—
TINAMIDAE	—	—

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)

[macuco], macuco, galo-do-mato

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)

[inhambuguaçu], nambuguaçu, inambuguaçu, nambu, inambu, inhambu

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Crypturellus undulatus (Temminck, 1815)

[jaó], jaó, joó

DA:ExB (MZUSP); FP:Pinto & Camargo (1956)

Crypturellus noctivagus (Wied, 1820)

[jaó-do-sul], jaó

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)

[inhambu-chororó], nambu-chororó, canela-roxa, nambuzinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)

[inhambu-chintã], nambu-chitã, nambu-chitão, inhambu-chitã, nambuzinho, canela-roxa

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)
[perdiz], perdiz, perdigão, perdiz-do-faxinal, perdiz-de-topete
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Nothura maculosa (Temminck, 1815)
[codorna-amarela], codorna, perdiz, codorniz
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Taoniscus nanus (Temminck, 1815)
[inhambu-carapé]
DA:ExE (NMW); FP:Pelzeln (1871)

ANSERIFORMES ANHIMIDAE

Anhima cornuta (Linnaeus, 1766)
[anhuma], anhumã
DA:ExB (MZUSP); FP:Pinto & Camargo (1956)

Chauna torquata (Oken, 1816)
[tachã]
DB:FoX (BEM); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816)
[marreca-caneleira]
DB:FoX (MAVV); RDB:FoI (WA-214127); FP:Bornschein *et al.* (1997)

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)
[irerê], irerê, marreca-irerê, ariri, apiaí
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)
[asa-branca], marreca-cabocla
DB:FoX (ACT); RDB:FoP (Scherer-Neto *et al.*, 2009b:9);
FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Coscoroba coscoroba (Molina, 1782)

[capororoca], ganso-branco

DA:ExD (MHNCI); Bornschein *et al.* (1993)

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

[pato-do-mato], pato-do-mato, pato, pato-bravo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering, 1907

[pato-de-crista], pato-branco, patão

DA:ExB (MZUSP)*; FP:Ihering & Ihering (1907)

Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816)

[marreca-de-coleira]

DB:FoX (MB); RDB:FoI (WA-197064); FP:não há

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)

[pé-vermelho], paturi, marreca, marrequinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

[***Anas flavirostris*** Vieillot, 1816]

[marreca-pardinha]

ICP; FP:Straube *et al.* (2009)

Anas georgica Gmelin, 1789

[marreca-parda]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Anas bahamensis Linnaeus, 1758

[marreca-toicinho]

DB:FoX (PF); RDB:FoP (Straube *et al.*, 2009:C4); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Anas versicolor Vieillot, 1816

[marreca-cri-cri]

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube *et al.* (2009)

[*Anas discors* Linnaeus, 1766]

[marreca-de-asa-azul]

ICP; FP:Straube *et al.* (2009)

Anas platalea Vieillot, 1816

[marreca-colhereira]

DA:ExD (MHNCI); FP:Vallejos *et al.* (2009)

Netta erythrophthalma (Wied, 1832)

[paturi-preta]

DB:FoX (RS); RDB:FoI (WA-297208); FP:Lara (1992)

Netta peposaca (Vieillot, 1816)

[marrecão]

DA:ExD (MHNCI); FP:Lara (1992)

Mergus octosetaceus Vieillot, 1817

[pato-mergulhão]

DA:ExB (MZUSP); FP:Sztolcman (1926)

Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766)

[marreca-de-bico-roxo], marreca-do-bico-azul

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

GALLIFORMES CRACIDAE

Ortalis guttata (Spix, 1825)

[aracuã], aracuã, aranguá, jacuquira

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Penelope supercilialis Temminck, 1815

[jacupemba], jacupemba, jacupeba, jacucaca, jacu-vermelho

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Penelope obscura Temminck, 1815

[jacuaçu], jacu-velho, jacuguaçu

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Aburria jacutinga (Spix, 1825)
[jacutinga], jacutinga, jacutingo, jacu-azul
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Crax fasciolata Spix, 1825
[mutum-de-penacho], mutum
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

ODONTOPHORIDAE

Odontophorus capueira (Spix, 1825)
[uru], uru, capoeira
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

PODICIPEDIFORMES PODICIPEDIDAE

Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 1824)
[mergulhão-de-orelha-branca]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)
[mergulhão-pequeno], mergulhão, marrequinha
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)
[mergulhão-caçador], mergulhão, marrequinha-d'água
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Podiceps major (Boddaert, 1783)
[mergulhão-grande]
DB:FoX (EC); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Podiceps occipitalis Garnot, 1826
[mergulhão-de-orelha-amarela]
DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (2004)

SPHENISCIFORMES
SPHENISCIDAE

Spheniscus magellanicus (Forster, 1781)
[pinguim-de-magalhães], pinguim, naufragado
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

PROCELLARIIFORMES
DIOMEDEIDAE

Thalassarche chlororhynchos (Gmelin, 1789)
[albatroz-de-nariz-amarelo]⁴
DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (1997)

Thalassarche melanophris (Temminck, 1828)
[albatroz-de-sobrancelha]
DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (1997)

Thalassarche chrysostoma (Forster, 1785)
[albatroz-de-cabeça-cinza]
ICP; FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Thalassarche cauta (Gould, 1841)
[albatroz-arisco]
DB:FoX (RK); FP:não há

Diomedea exulans Linnaeus, 1758]
[albatroz-gigante]
ICP; FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

⁴ Embora todos os representantes da família Diomedidae sejam reconhecidos pela denominação de “albatroz”, desconhece-se que esse nome seja usado popularmente no Paraná, provavelmente em virtude da dificuldade de observá-los, visto serem quase que exclusivamente oceânicos.

PROCELLARIIDAE

Macronectes giganteus (Gmelin, 1789)

[petrel-gigante]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[*Macronectes halli* Mathews, 1912]

[petrel-gigante-do-norte]

ICP; FP:Moraes & Krul (1997)

Fulmarus glacialoides (Smith, 1840)

[pardelão-prateado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Daption capense (Linnaeus, 1758)

[pomba-do-cabo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[*Pterodroma mollis* (Gould, 1844)]

[grazina-mole]

ICP⁵; FP:Moraes & Krul (1997)

[*Pterodroma incerta* (Schlegel, 1863)]

[grazina-de-barriga-branca]

ICI⁶; FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[*Pachyptila vittata* (Forster, 1777)]

[faigão-de-bico-largo]

ICP; FP:Moraes & Krul (1997)

⁵ Registros visuais adicionais foram colhidos por Fábio Olmos (*in litt.*, 2010) na plataforma continental brasileira a 25°15'S/44°55'W em 25 de novembro de 1994.

⁶ Registros visuais (Fábio Olmos, *in litt.*, 2010), na plataforma continental brasileira a 25°13'S/44°52'W, 25°13'S/44°53'W, 25°15'S/44°55'W (respectivamente em 23, 24 e 25 de novembro de 1994) e a 25°58'S/ 45°34'W e 25°54'S/45°35'W (em 24 e 25 de março de 1995).

Pachyptila belcheri (Mathews, 1912)

[faigão-de-bico-fino]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Procellaria aequinoctialis Linnaeus, 1758

[pardela-preta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Moraes & Krul (1995)

[*Procellaria conspicillata* Gould, 1844]

[pardela-de-óculos]

ICP; FP:Olmos (2001)

[*Calonectris edwardsii* (Oustalet, 1883)]

[bobo-de-cabo-verde]

ICP; FP:Krul & Moraes (1994b)

[*Puffinus griseus* (Gmelin, 1789)]

[bobo-escuro]

ICP; FP:Moraes & Krul (1993b)

***Puffinus gravis* (O'Reilly, 1818)**

[bobo-grande-de-sobre-branco]

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1991d)

***Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764)**

[bobo-pequeno]

DA:ExD (MHNCI); FP:Moraes & Krul (1993b)

[*Puffinus lherminieri* Lesson, 1839]

[pardela-de-asa-larga]

ICI ⁷; FP:não há

⁷ Em 6 de julho de 1994 e 30 de julho de 1995, obteve-se registros visuais na plataforma continental brasileira, nas coordenadas de 25°33'S/45°34'W e 25°57'S/45°50'W, respectivamente (Fábio Olmos, *in litt.*, 2010).

HYDROBATIDAE

Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820)

[alma-de-mestre]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

CICONIIFORMES CICONIIDAE

Ciconia maguari (Gmelin, 1789)

[maguari], cegonha, cauauã, baguari, joão-grande

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819)

[tuiuiú], jaburu, jabiru, tuiuiú

DB:FoX (ACT); RDB:FoP (Scherer-Neto *et al.*, 2009b);

FP:Scherer-Neto *et al.* (2009b)

Mycteria americana Linnaeus, 1758

[cabeça-seca], cabeça-seca, jaburu

DA:ExD (M7Q); FP:Straube *et al.* (1996)

SULIFORMES FREGATIDAE

Fregata magnificens Mathews, 1914

[tesourão], tesoureiro, fragata, alcatraz, tesoura, grapira, tesourão

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

SULIDAE

[*Sula dactylatra* Lesson, 1831]

[atobá-grande]

ICP; FP:Moraes & Krul (1997)

Sula leucogaster (Boddaert, 1783)

[atobá-pardo], atobá, pato-do-mar, ganso-do-mar, alcatraz, mergulhão

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)

[biguá], biguá, mergulhão, cormorão

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

ANHINGIDAE

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)

[biguatinga], biguatinga

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

PELECANIFORMES ARDEIDAE

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)

[socó-boi], socó-boi

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Tigrisoma fasciatum (Such, 1825)

[socó-boi-escuro], socó-jararaca

DA:ExE (MIZ)*; FP:Sztolcman (1926)

Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766)

[arapapá]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

[Botaurus pinnatus] (Wagler, 1829)]

[socó-boi-baio], socó

ICP; FP:Anjos & Seger (1988)

Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789)]

[socoí-vermelho]

ICP; FP: Straube *et al.* (2004)

Ixobrychus involucris (Vieillot, 1823)

[socoí-amarelo]

DA:ExD (MHNCI); FP: Scherer-Neto & Straube (1995)

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

[savacu], socó-dorminhoco, socó-bruxa, socó

DA:ExD (MHNCI); FP: Pelzeln (1871)

Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758)

[savacu-de-coroa], socó-do-mangue

DA:ExD (MHNCI); FP: Pelzeln (1871)

Butorides striata (Linnaeus, 1758)

[socozinho], socozinho, socó-mirim

DA:ExD (MHNCI); FP: Pelzeln (1871)

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

[garça-vaqueira], garça-vaqueira, garça-boiadeira, garça-tropeira

DA:ExD (MHNCI); FP: Scherer-Neto (1980)

Ardea cocoi Linnaeus, 1766

[garça-moura], João-grande, garça-cinza, manguari, garça-parda

DA:ExD (MHNCI); FP: Pelzeln (1871)

Ardea alba Linnaeus, 1758

[garça-branca-grande], garça, garça-grande

DA:ExD (MHNCI); FP: Pelzeln (1871)

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)

[maria-faceira], maria-faceira, garça-do-campo, socó

DA:ExD (MHNCI); FP: Chrostowski (1912)

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783)

[garça-real]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Egretta thula (Molina, 1782)

[garça-branca-pequena], garcinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758)

[garça-azul], garça-morena, garça-azul

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

THRESKIORNITHIDAE

Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758)

[guará], guará

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Plegadis chihi (Vieillot, 1817)

[caraúna-de-cara-branca], maçarico, maçaricão

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)

[coro-coró], sapacuru, coro-coró, corvo-d'água

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)

[tapicuru-de-cara-pelada], tapicuru, guaraúna, maçaricão

DA:ExD (MHNCI); FP:Schubart *et al.* (1965)

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)

[curicaca], curucaca, curicaca

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Platalea ajaja Linnaeus, 1758

[colhereiro], colhereiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

PHOENICOPTERIFORMES
PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus chilensis Molina, 1782

[flamingo-chileno]

DB:FoX (MK); FP:não há

Phoenicoparrus andinus (Philippi, 1854)

[flamingo-grande-dos-andes]

DA:ExD (MHNCI); FP:Carrano & Scherer-Neto (2000)

CATHARTIFORMES
CATHARTIDAE

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

[urubu-de-cabeça-vermelha], urubu-cabeça-vermelha, corvo-pimenta, corvo-linguíça, camiranga

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Cathartes burrovianus Cassin, 1845

[urubu-de-cabeça-amarela], urubu-cabeça-amarela

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1995)

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)

[urubu-de-cabeça-preta], urubu, corvo, urubu-preto

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)

[urubu-rei], urubu-rei, corvo-branco

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

ACCIPITRIFORMES
PANDIONIDAE

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

[águia-pescadora]

DB:FoX (FS); RDB:FoI (WA-272396); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

ACCIPITRIDAE

Leptodon cayanensis (Latham, 1790)

[gavião-de-cabeça-cinza], gavião-cinza

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822)

[caracoleiro]

DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein & Straube (1991)

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)

[gavião-tesoura], gavião-tesoura, gavião-tesoureiro, tesoura

DA:ExD (MHNCI); FP:Conover (1949)

Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825

[gaviãozinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Carrano (1998a)

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)

[gavião-peneira], gavião-peneira

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Harpagus diodon (Temminck, 1823)

[gavião-bombachinha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

[*Circus cinereus* Vieillot, 1816]

[gavião-cinza]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1993)

Circus buffoni (Gmelin, 1788)

[gavião-do-banhado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824)

[tauató-pintado]

DA:ExD (MCNPR); FP:Carrano *et al.* (2001)

Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766)

[gavião-miudinho]

DA:ExE (MIZ)*; FP:Chrostowski (1912)

Accipiter striatus Vieillot, 1818

[gavião-miúdo], gaviãozinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)

[gavião-bombachinha-grande]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)

[sovi], gavião-pombo, sorvi

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Busarellus nigricollis (Latham, 1790)

[gavião-belo], gavião-velho

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)

[gavião-caramujeiro], gavião-caramujeiro, caramujeiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)

[gavião-pernilongo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Buteogallus aequinoctialis (Gmelin, 1788)

[caranguejeiro], gavião-do-mangue, gavião-caranguejeiro,
gavião-mangueiro

DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)

[gavião-caboclo], gavião-vermelho, gavião-fumaça, penacho,
gavião-caboclo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827)

[gavião-pombo-pequeno]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788)

[gavião-preto], gavião-preto, urubutinga

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Urubitinga coronata (Vieillot, 1817)

[águia-cinzenta]

DA:ExB (MZUSP); FP:Pelzeln (1871)

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)

[gavião-carijó], gavião-carijó, gavião-pega-pinto, papa-pinto

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)

[gavião-asa-de-telha]

DB:FoX (DR); RDB:FoI (WA-156388); FP:não há

Parabuteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824)

[gavião-de-sobre-branco]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816)

[gavião-de-rabo-branco], gavião-campeiro, gavião-branco

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)

[águia-chilena]

DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Pseudastur polionotus (Kaup, 1847)

[gavião-pombo-grande], gavião-branco, gavião-pombo

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Buteo nitidus (Latham, 1790)

[gavião-pedrês]

DB:AsP (AUF); FP:Straube & Urben-Filho (2005)

Buteo brachyurus Vieillot, 1816

[gavião-de-cauda-curta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Buteo swainsoni Bonaparte, 1838

[gavião-papa-gafanhoto]

DB:FoX (EC); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Buteo albonotatus Kaup, 1847

[gavião-de-rabo-barrado], gavião-urubu

DA:ExE (FMNH)*; FP:Conover (1949)

Morphnus guianensis (Daudin, 1800)

[uiraçu-falso]

DA:ExD (M7Q); FP:Bornschein & Straube (1991)

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)

[gavião-real], harpia, nhapecani

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto (1938)

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)

[gavião-pega-macaco], gavião-macaco, inhapacanim-do-preto, pega-macaco, apacanim-preto

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816)

[gavião-pato], gavião-pato, inhapacanim-do-branco, apacanim-branco

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)

[gavião-de-penacho], gavião-de-penacho, penacho

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

FALCONIFORMES
FALCONIDAE

Ibycter americanus (Boddaert, 1783)

[gralhão], caracará-preto

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Caracara plancus (Miller, 1777)

[caracará], carancho, carcará, caracará

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

[carrapateiro], gavião-carrapateiro, pinhé, caracará-branco, carapinhé, espinhé

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Milvago chimango (Vieillot, 1816)

[chimango], gavião-da-praia, chimango

DA:ExD (MHNCI); FP:Vallejos & Deconto (2009)

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)

[acauã], acauã, cauã

DB:FoX (ACC); RDB:FoI (WA-162288); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)

[falcão-caburé], gavião-da-mata, gavião

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)

[falcão-relógio], gavião-coruja

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Falco sparverius Linnaeus, 1758

[quiriquiri], quiquiri, gavião-cricri, gaviãozinho-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Falco rufigularis Daudin, 1800

[cauré], gaviãozinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Falco femoralis Temminck, 1822

[falcão-de-coleira], falcão-coleira, gavião-coleira, gavião-de-coleira

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Falco peregrinus Tunstall, 1771

[falcão-peregrino], falcão-peregrino

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

GRUIFORMES ARAMIDAE

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)

[carão], carão

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

RALLIDAE

[*Micropygia schomburgkii* (Schomburgk, 1848)]

[maxalalagá]

ICP; FP:Uejima & Bornschein (2007)

Rallus longirostris Boddaert, 1783

[saracura-matraca], saracura-do-mangue, matraca

DB:FoX (FS); RDB:FoI (WA-170208); FP:Straube (1990)

[*Aramides ypecaha* (Vieillot, 1819)]

[saracuruçu]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1997)

[*Aramides mangle* (Spix, 1825)]

[saracura-do-mangue]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1997)

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)
[saracura-três-potes], saracura-três-potes, saracura, sericoia, três-potes

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Aramides saracura (Spix, 1825)
[saracura-do-mato], saracura, saracura-do-mato, saracura-três-potes

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847)

[saracura-lisa]

DA:ExE (MNB) *; FP:Raposo *et al.* (1994)

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)

[sanã-parda], monjolinho, jaçanã, saracurinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Hellmayr & Conover (1942)

Laterallus exilis (Temminck, 1831)

[sanã-do-capim]

DA:ExD (MNHCI)⁸; FP:não há

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819)

[sanã-vermelha], monjolinho, saracurinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Porzana flaviventer (Boddaert, 1783)

[sanã-amarela]

DA:ExB (MN); FP:Bornschein *et al.* (1997)

⁸ Um indivíduo da espécie foi coletado em 14 de maio de 2004 por Luiz Gonçalves na Reserva Natural Morro da Mina (km 7 da BR-340), município de Antonina. Encaminhado ao MHNCI por André de Meijer, consta do acervo de meio líquido (MHNCI(ML)-3493), em virtude da impossibilidade de ser preparado como pele (A. de Meijer, *in litt.*, 2011).

Porzana albicollis (Vieillot, 1819)

[sanã-carijó], currutêu

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Neocrex erythrops (Sclater, 1867)

[turu-turu]

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube *et al.* (2004)

Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783)

[saracura-carijó], saracura-carijó

DA:ExD (MHNCI); FP:Westcott (1980)

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)

[saracura-sanã], saracura-preta, saná

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1837)

[saracura-do-banhado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818)

[frango-d'água-comum], frango-d'água, franguinho-d'água

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Gallinula melanops (Vieillot, 1819)

[frango-d'água-carijó]

DA:ExD (MHNCI); FP:Krul & Moraes (1993)

Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766)

[frango-d'água-azul], frango-d'água-azul

DA:ExD (MHNCI); FP:Westcott (1980)

Porphyrio flavirostris (Gmelin, 1789)

[frango-d'água-pequeno]

DA:ExD (M7Q); FP:Bornschein & Reinert (1997)

Fulica armillata Vieillot, 1817
[carqueja-de-bico-manchado], mergulhão
DA:ExE (AMNH) *; FP:Seger *et al.* (1993)

Fulica rufifrons Philippi & Landbeck, 1861]
[carqueja-de-escudo-vermelho]
ICP; FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Fulica leucoptera Vieillot, 1817
[carqueja-de-bico-amarelo]
DB:FoX (PF)⁹; RDB:FoP (Straube *et al.*, 2009:C17);
FP:Westcott (1980)

HELIORNITHIDAE

Heliornis fulica (Boddaert, 1783)
[picaparra], pecapará
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

CARIAMIFORMES CARIAMIDAE

Cariama cristata (Linnaeus, 1766)
[seriema], seriema, siriema
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE

Vanellus cayanus (Latham, 1790)
[batuira-de-esporão]
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

⁹ Em setembro de 2004, Priscila Forone fotografou a espécie nas cavas do Rio Iguaçu, próximo do Zoológico de Curitiba (bairro Alto Boqueirão). Uma dessas imagens, atribuída apenas a *Fulica leucoptera*, foi publicada por Straube *et al.* (2009:51), mas ali aparece também *Fulica armillata* em segundo plano.

Vanellus chilensis (Molina, 1782)

[quero-quero], quero-quero, tetéu

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776)

[batuiruçu], batuíra

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

[Pluvialis squatarola] (Linnaeus, 1758)]

[batuiruçu-de-axila-preta], batuíra

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1997)

Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825

[batuíra-de-bando], batuíra

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Charadrius collaris Vieillot, 1818

[batuíra-de-coleira], batuíra-da-praia, maçarico, batuíra

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Charadrius modestus Lichtenstein, 1823

[batuíra-de-peito-tijolo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

HAEMATOPODIDAE

Haematopus palliatus Temminck, 1820

[piru-piru], batuirão-bico-de-lacre, batuíra-do-mar-grosso

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus melanurus Vieillot, 1817

[pernilongo-de-costas-brancas], quem-quem

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[CHIONIDIDAE]

[*Chionis albus* (Gmelin, 1789)]

[pomba-antártica]

ICP; Scherer-Neto (1985)

SCOLOPACIDAE

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)

[narceja], narceja, bicudo, batuíra-gás, batuíra

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Gallinago undulata (Boddaert, 1783)

[narcejão], galinhola

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Limosa haemastica (Linnaeus, 1758)

[maçarico-de-bico-virado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[*Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)]

[maçarico-galego]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1997)

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)

[maçarico-do-campo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (1997)

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)

[maçarico-pintado]

DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Tringa solitaria Wilson, 1813

[maçarico-solitário], batuíra

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)
[maçarico-grande-de-perna-amarela], batuíra
DA:ExD (MHNCI); FP:Westcott (1980)

[*Tringa semipalmata* (Gmelin, 1789)]
[maçarico-de-asa-branca]
ICP; FP:Moraes & Krul (1993a)

Tringa flavipes (Gmelin, 1789)
[maçarico-de-perna-amarela], batuíra
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
[vira-pedras]
DB:FoX (EC); FP:Moraes & Krul (1995)

Calidris canutus (Linnaeus, 1758)
[maçarico-de-papo-vermelho]
DB:FoX (EC); FP:Moraes & Krul (1993a)

Calidris alba (Pallas, 1764)
[maçarico-branco]
DB:FoX (EC); FP:Moraes (1991)

[*Calidris minutilla* (Vieillot, 1819)]
[maçariquinho]
ICP; FP:Moraes & Krul (1995)

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)
[maçarico-de-sobre-branco]
DB:FoX (RS); RDB:FoI (WA-226748); FP:Westcott (1980)

[*Calidris bairdii* (Coues, 1861)]
[maçarico-de-bico-fino]
ICP; FP:Moraes & Krul (1995)

Calidris melanotos (Vieillot, 1819)

[maçarico-de-colete], batuirinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[*Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826)]

[maçarico-pernilongo]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1997)

Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819)

[maçarico-acanelado]

DA:ExB (MN); FP:Bornschein *et al.* (1997)

Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819)

[pisa-n'água]

DB:FoX (VPG); RDB:FoP (Scherer-Neto *et al.*, 2008b);

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

JACANIDAE

Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

[jaçanã], jaçanã, cafezinho, passarinho-bravo

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

ROSTRATULIDAE

Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816)

[narceja-de-bico-torto]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1993)

STERCORARIIDAE

Stercorarius maccormicki Saunders, 1893

[mandrião-do-sul]

DB:FoX (DGN); RDB:FoI (WA-152446); FP:Moraes & Krul (1994)

Stercorarius antarcticus (Lesson, 1831)

[mandrião-antártico]

ExD:MHNCI; FP:Moraes & Krul (1994)

Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)

[mandrião-pomarino]

DB:FoX (FO); RDB:FoI (WA-145285); FP:não há

[*Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)]

[mandrião-parasítico]

ICP; FP:Olmos (2000)

[*Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819]

[mandrião-de-cauda-comprida]

ICI¹⁰; FP:não há

LARIDAE

Chroicocephalus maculipennis (Lichteistein, 1823)

[gaivota-maria-velha], maria-velha

DB:FoX (RC); RDB:FoI (WA-35783); FP:Scherer-Neto (1980)

[*Chroicocephalus cirrocephalus* (Vieillot, 1818)]

[gaivota-de-cabeça-cinza]

ICP; FP:Moraes & Krul (1993a)

Larus dominicanus Lichtenstein, 1823

[gaivotão], gaivota, gaivota-pintada (jovem)

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

STERNIDAE

Anous stolidus (Linnaeus, 1758)

[trinta-réis-escuro]

DA:ExD (MHNCI); FP:Carrano & Jablonski (1997)

¹⁰ Em 28 de setembro de 2000, Ricardo Krul (*in litt.*), registrou a espécie no Balneário de Atami (município de Pontal do Paraná).

Sternula superciliaris (Vieillot, 1819)

[trinta-réis-anão]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)

[trinta-réis-grande], gaivota-do-rio

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

[trinta-réis-boreal]

DA:ExD (MHNCI); FP:Krul & Moraes (1993)

Sterna hirundinacea Lesson, 1831

[trinta-réis-de-bico-vermelho]

DB:FoX (EC); FP:Scherer-Neto (1980)

Sterna trudeaui Audubon, 1838

[trinta-réis-de-coroa-branca]

DB:FoX (EC); FP:não há

Thalasseus acuflavidus (Cabot, 1847)

[trinta-réis-de-bando], gaivota-pequena, trinta-réis

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Thalasseus maximus (Boddaert, 1783)

[trinta-réis,-real], gaivota-grande

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

RYNCHOPIDAE

Rynchops niger Linnaeus, 1758

[talha-mar], talha-mar, bico-tesoura

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE

Columbina minuta (Linnaeus, 1766)

[rolinha-de-asa-canela]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)

[rolinha-roxa], rolinha, rolinha-vermelha, rolinha-roxa, paruru, pururu, pararu

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Columbina squammata (Lesson, 1831)

[fogo-apagou], fogo-apagou, fogo-pagou, rolinha-do-chiqueiro, rolinha-cascavel, rolinha-pedrês

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Columbina picui (Temminck, 1813)

[rolinha-pucui], rolinha-asa-branca

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)

[pararu-azul], pomba-azul

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[*Claravis geoffroyi* (Temminck, 1811)]

[pararu-espelho]

ICP; FP:Straube (1990)

Columba livia Gmelin, 1789

[pombo-doméstico], pombo, pomba

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube *et al.* (2009)

Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789)

[pomba-trocal]

DA:ExD (M7Q); FP:Anjos & Graf (1993)

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

[pombão], asa-branca, pomba-legítima, pombão, pomba-asa-branca, pomba-carijó

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Patagioenas cayennensis (Bonaterre, 1792)

[pomba-galega], pomba-do-ar, pomba-galega, pomba-preta, pomba-legítima

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)

[pomba-amargosa], pomba-torcaz, pomba-da-mata, picuçuroba, cassoroba, pomba-preta

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

[pomba-de-bando], amargosinha, pomba-amargosa, pomba-de-bando, pomba-do-arroz

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855

[juriti-pupu], juriti, juruti

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)

[juriti-gemeadeira], juriti, juruti

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Geotrygon violacea (Temminck, 1809)

[juriti-vermelha]

DA:ExE (AMNH) *; FP:Sztolcman (1926)

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)

[pariri], parari, juriti-da-mata, juriti-do-chão, juriti-vermelha

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

PSITTACIFORMES
PSITTACIDAE

Ara ararauna (Linnaeus, 1758)

[arara-canindé], arara-amarela, arara-canindé

DB:FoX (ACT); RDB:FoP (Terto & Scherer-Neto, 2011);

FP:Scherer-Neto *et al.* (2009a)

Ara chloropterus Gray, 1859

[arara-vermelha-grande], arara-vermelha

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Primolius maracana (Vieillot, 1816)

[maracanã-verdadeira], maracanã, ararinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776)

[periquitão-maracanã], araguaí, araguari, maracanã, maritaca

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820)

[jandaia-de-testa-vermelha], jandaia

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Aratinga aurea (Gmelin, 1788)

[periquito-rei], maritaquinha-cabeça-de-coco

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)

[tiriba-de-testa-vermelha], tiriva, periquito

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)

[tuim], tuim, toim, cu-tapado

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)
[periquito-rico], periquito, periquito-verde
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)
[periquito-de-encontro-amarelo]
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube *et al.* (1996)

Touit melanonotus (Wied, 1820)
[apuim-de-costas-pretas], sininga
ICI ¹¹; FP:não há

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769)
[cuiú-cuiú], cuiú-cuiú, cuvu, catorra
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)
[maitaca-verde], baitaca, papagaio, maritacão
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Amazona vinacea (Kuhl, 1820)
[papagaio-de-peito-roxo], papagaio, papagaio-de-peito-roxo,
peito-roxo, curraleiro
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

¹¹ A impossibilidade de aferição do documento (vocalização gravada) alegadamente colhido por Juan Mazar Barnett em 2 de dezembro de 2002 na “parte alta da Estrada da Graciosa” (*cf.* Barnett *et al.*, 2004) é impedimento para sua inclusão na lista primária; ademais, é possível que tenha ocorrido um erro de identificação. No entanto, a espécie é sabidamente ocorrente no Paraná, segundo contatos de Eduardo Carrano, com Pedro Scherer-Neto (APA de Guaratuba, 1996) e com Louri Klemann Júnior (Rio Canasvieiras, Guaratuba, 2002: bando com mais de 20 indivíduos), além de M.A.V.Vallejos, L.R.Deconto, T.Molin, S.Baijuk (Porto de Cima, Morretes, 18 de abril e 1º de maio de 2009). Esses e provavelmente outros registros se encontram em preparação e a documentação estadual deve ocorrer em muito breve.

Amazona brasiliensis (Linnaeus, 1758)
[papagaio-de-cara-roxa], papagaio, papagaio-de-cara-roxa, cara-roxa
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

[*Amazona amazonica* (Linnaeus, 1766)]
[curica]
ICP; FP:Scherer-Neto (1983)

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)
[papagaio-verdadeiro], papagaio, papagaio-verdadeiro
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Triclaria malachitacea (Spix, 1824)
[sabiá-cica], cunhataí, sabiacica
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Scherer-Neto (1995)

CUCULIFORMES CUCULIDAE	
---------------------------	--

[*Micrococcyx cinereus* Vieillot, 1819]
[papa-lagarta-cinzento]
ICP; FP:Bornschein *et al.* (1993)

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)
[alma-de-gato], alma-de-gato, sirigaita, rabo-de-palha
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering (1904)

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817
[papa-lagarta-acanelado]
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)
[papa-lagarta-de-asa-vermelha]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Coccyzus euleri Cabanis, 1873

[papa-lagarta-de-euler]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

[*Coccyzus erythrophthalmus* (Wilson, 1811)]

[papa-lagarta-de-bico-preto]

ICP; FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Crotophaga major Gmelin, 1788

[anu-coroca], anu-coroca, anu-paraguaio

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

[anu-preto], anu, anu-preto

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Guira guira (Gmelin, 1788)

[anu-branco], anu, anu-branco, alma-de-gato, anu-paulista

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

[saci], saci, fim-fim, peixe-frito

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)

[peixe-frito-verdadeiro]

DA:ExD (MHNCI); FP:não há

Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870

[peixe-frito-pavonino]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

STRIGIFORMES TYTONIDAE	
---------------------------	--

Tyto alba (Scopoli, 1769)

[coruja-da-igreja], suindara, sundara, sundaia, coruja-de-igreja, coruja-branca

DA:ExD(MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

STRIGIDAE	
-----------	--

Megascops choliba (Vieillot, 1819)

[corujinha-do-mato], corujinha, caburé, caburé-do-mato

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Megascops atricapilla (Temminck, 1822)

[corujinha-sapo], corujinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897)

[corujinha-do-sul], corujinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Mlikovsky (2009)

Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790)

[murucututu]

DA:ExB (MZUSP); FP:Scherer-Neto (1980)

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901)

[murucututu-de-barriga-amarela], mocho-do-mato, murucututu

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory (1918)

Strix hylophila Temminck, 1825

[coruja-listrada], coruja

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Strix virgata (Cassin, 1849)

[coruja-do-mato]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Strix huhula Daudin, 1800

[coruja-preta]

DA:ExD (MHNLTs); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Glaucidium minutissimum (Wied, 1830)

[caburé-miudinho], caburé, caburé-do-macuco

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)

[caburé], caburé, caburezinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Athene cunicularia (Molina, 1782)

[coruja-buraqueira], coruja-buraqueira, coruja-do-campo,
buraqueira

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Aegolius harrisii (Cassin, 1849)

[caburé-acanelado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Asio clamator (Vieillot, 1808)

[coruja-orelhuda], coruja-orelhuda, mocho-orelhudo, coruja-de-orelha

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Asio stygius (Wagler, 1832)

[mocho-diabo], mocho-diabo

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

[mocho-dos-banhados]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

CAPRIMULGIFORMES
NYCTIBIIDAE

Nyctibius aethereus (Wied, 1820)

[mãe-da-lua-parda]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

[mãe-da-lua], urutau, urutágua, urutago, mãe-da-lua

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

CAPRIMULGIDAE

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)

[tuju], sundaia, curiango

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783)

[bacurau-de-asa-fina]

DA:ExB (MN); FP:Bornschein *et al.* (1997)

Chordeiles minor (Forster, 1771)

[bacurau-norte-americano]

DA:ExD (MHNCI); FP:Anjos & Schuchmann (1997)

Podager nacunda (Vieillot, 1819)

[corucão]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)

[bacurau], curiango, bacurau, mãe-eu-vou, para-rua

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844)

[bacurau-ocelado]

DA:ExD (M7Q); FP:Straube & Bornschein (1991b)

Caprimulgus rufus Boddaert, 1783

[joão-corta-pau]

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube *et al.* (1996)

[*Caprimulgus sericocaudatus* (Cassin, 1849)]

[bacurau-rabo-de-seda]

ICP; FP:Straube *et al.* (2004)

Caprimulgus longirostris Bonaparte, 1825

[bacurau-da-telha], pai-avô, morcego

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube (1990b)

Caprimulgus parvulus Gould, 1837

[bacurau-chintã], curiango, curiango-aguinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)

[bacurau-tesoura], curiango-tesoura

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Macropsalis forcipata (Nitzsch, 1840)

[bacurau-tesoura-gigante], curiango-rabo-de-fita, rabo-de-palha,
curiango-tesoureiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Eleothreptus anomalus (Gould, 1838)

[curiango-do-banhado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

APODIFORMES

APODIDAE

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848)

[taperuçu-preto]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Cypseloides senex (Temminck, 1826)
[taperuçu-velho], andorinha, andorinhão-da-cachoeira
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1983)

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)
[taperuçu-de-coleira-branca], tapema, taperá, andorinhão,
andorinhão-de-coleira
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto (1938)

Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866)
[taperuçu-de-coleira-falha]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pichorim & Bornschein (1993)

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862
[taperuçu-de-sobre-cinza]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907
[andorinhão-do-temporal], andorinha
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Panyptila cayennensis (Gmelin, 1789)
[andorinhão-estofador]
ICP; FP:Pichorim & Bornschein (2001)

TROCHILIDAE

Ramphodon naevius (Dumont, 1818)
[beija-flor-rajado], beija-flor¹², cuitelo-do-grande
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

¹² No Paraná, todos os representantes da família Trochilidae, são conhecidos pelas denominações “beija-flor”, “colibri”, “cuitelo”, “cuitelinho”, “pica-flor” e “passarinho-de-nossa-senhora”. Não há, em geral, interesse em distingui-los, o que ocorre eventualmente quando duas ou mais espécies são observadas ao mesmo tempo e, mesmo assim, utilizando-se adjetivos meramente oportunistas.

[*Glaucis hirsutus* (Gmelin, 1788)]

[balança-rabo-de-bico-canela]

ICP; FP:Bornschein (2001)

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822)

[rabo-branco-pequeno]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)

[rabo-branco-acanelado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Westcott (1980)

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)

[rabo-branco-de-garganta-rajada], beija-flor-do-rabo-branco

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)

[beija-flor-tesoura], beija-flor-de-tesoura

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube *et al.* (2006)

Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818)

[beija-flor-cinza], beija-flor

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Florisuga fusca (Vieillot, 1817)

[beija-flor-preto], beija-flor-preto, beija-flor-do-rabo-branco

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)

[beija-flor-de-orelha-violeta], beija-flor-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

[beija-flor-de-veste-preta], beija-flor

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

[*Chrysolampis mosquitus* (Linnaeus, 1758)]

[beija-flor-vermelho]

ICP; FP:Westcott (1980)

***Stephanoxis lalandi* (Vieillot, 1818)**

[beija-flor-de-topete], beija-flor-de-penacho

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

***Lophornis magnificus* (Vieillot, 1817)**

[topetinho-vermelho]

DA:ExB (MZUSP); FP:Pinto (1938)

***Lophornis chalybeus* (Vieillot, 1822)**

[topetinho-verde], beija-flor

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

***Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)**

[besourinho-de-bico-vermelho], beija-flor, cuitelo

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

***Thalurania furcata* (Gmelin, 1788)**

[beija-flor-tesoura-verde]

DA:ExB (MZUSP); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

***Thalurania glaucopsis* (Gmelin, 1788)**

[beija-flor-de-fronte-violeta], beija-flor-de-cabeça-azul, beija-flor-tesoura

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

***Hylocharis sapphirina* (Gmelin, 1788)**

[beija-flor-safira]

DA:ExD (MZUEL)*; FP:Steffan (1974)

[*Hylocharis cyanus* Vieillot, 1818]

[beija-flor-roxo]

ICP; FP:Anjos & Ferreira (1998)

Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)

[beija-flor-dourado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)

[beija-flor-de-papo-branco], beija-flor, cuitelo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)]

[beija-flor-de-bico-curvo]

ICI¹³; FP:Não há

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)

[beija-flor-de-banda-branca]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)

[beija-flor-de-garganta-verde]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Amazilia lactea (Lesson, 1832)

[beija-flor-de-peito-azul]

DA:ExD (MHNCI); FP:Wescott (1980)

Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783)

[beija-flor-rubi], beija-flor-do-brinco-de-princesa

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Heliothryx auritus (Gmelin, 1788)

[beija-flor-de-bochecha-azul]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

¹³ Em 30 de dezembro de 2008, um macho da espécie foi observado por Eduardo Carrano, Márcio Repenning, Carla S.Fontana e Marina Marins pousado em uma vassoura (família Asteraceae) em uma área de campo alterado com arbustos, próximo ao Rio das Mortes, município de Jaguariaíva. A espécie é conhecida das adjacências sul-mato-grossenses de onde provêm, inclusive, espécime comprobatório (Straube *et al.*, 1996).

[*Heliomaster longirostris* (Audebert & Vieillot, 1801)]

[bico-reto-cinzento]

ICP; FP: Straube & Bornschein (1995)

[*Heliomaster squamosus* (Temminck, 1823)]

[bico-reto-de-banda-branca]

ICP; FP: Westcott (1980)

***Heliomaster furcifer* (Shaw, 1812)**

[bico-reto-azul]

DB: FoX (DI); RDB: FoI (WA-22977); FP: não há

***Calliphlox amethystina* (Boddaert, 1783)**

[estrelinha-ametista], cuitelinho-zangão, besourinho

DA: ExD (MHNCI); FP: Pelzeln (1871)

TROGONIFORMES TROGONIDAE

***Trogon viridis* Linnaeus, 1766**

[surucuá-grande-de-barriga-amarela], surucuá-amarelo, surucuá-de-peito-amarelo

DA: ExD (MHNCI); FP: Scherer-Neto & Straube (1995)

***Trogon surrucura* Vieillot, 1817**

[surucuá-variado], surucuá-vermelho, surucuá-de-peito-vermelho

DA: ExD (MHNCI); FP: Ihering & Ihering (1907)

***Trogon rufus* Gmelin, 1788**

[surucuá-de-barriga-amarela], surucuá-verde, surucuá-do-amarelo

DA: ExD (MHNCI); FP: Sztolcman (1926)

CORACIIFORMES ALCEDINIDAE	
------------------------------	--

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)
[martim-pescador-grande], martim-pescador, martim-pescador-
do-grande, caracachá, martim-grande
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)
[martim-pescador-verde], martim-pescador, pica-peixe
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Chloroceryle aenea (Pallas, 1764)
[martinho], martinho, martim-pescador-anão
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1991a)

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)
[martim-pescador-pequeno], martim-pescador
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1901)

Chloroceryle inda (Linnaeus, 1766)
[martim-pescador-da-mata], martim-pescador-de-topete
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

MOMOTIDAE	
-----------	--

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818)
[juruva-verde], juruva, juruva, tirivão
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Momotus momota (Linnaeus, 1766)
[udu-de-coroa-azul]
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1995)

GALBULIFORMES GALBULIDAE	
-----------------------------	--

Jacamara leucopygia tridactyla (Vieillot, 1817)
[cuitelão]
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Galbula ruficauda Cuvier, 1816
[ariramba-de-cauda-ruiva], bico-de-agulha
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

BUCCONIDAE	
------------	--

Notharchus swainsoni (Gray, 1846)
[macuru-de-barriga-castanha]
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)
[joão-bobo], joão-bobo, joão-tolo
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Malacoptila striata (Spix, 1824)
[barbudo-rajado], joão-barbudo
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Nonnula rubecula (Spix, 1824)
[macuru]
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

PICIFORMES RAMPHASTIDAE	
----------------------------	--

Ramphastos toco Statius Muller, 1776
[tucanuçu], tucano-uçu, tucano-toco
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823
[tucano-de-bico-preto], tucano-do-bico-preto
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766
[tucano-de-bico-verde], tucano-do-bico-verde
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823)
[araçari-poca], tucambarro, tucaninho, araçari-poca, araçari-minhoca
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)
[araçari-banana], araçari-banana
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758)
[araçari-de-bico-branco], araçari
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Pteroglossus castanotis Gould, 1834
[araçari-castanho], saripoca, araçari, tucaninho
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

PICIDAE

Picumnus cirratus Temminck, 1825
[pica-pau-anão-barrado]
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845
[pica-pau-anão-de-coleira], picapauzinho, pica-pau-anão
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 1840
[pica-pau-anão-escamado]
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Picumnus nebulosus Sundevall, 1866

[pica-pau-anão-carijó]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Melanerpes candidus (Otto, 1796)

[pica-pau-branco], birro, pica-pau-branco

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1816)

[pica-pau-de-testa-amarela], binidito, benedito, pica-pau-chumbeado

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766)

[picapauzinho-anão]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)

[picapauzinho-verde-carijó], picapauzinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Piculus flavigula (Boddaert, 1783)

[pica-pau-bufador]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Piculus aurulentus (Temminck, 1821)

[pica-pau-dourado], pica-pau-fim-fim

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)

[pica-pau-verde-barrado], pica-pau-meleiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

[pica-pau-do-campo], pica-pau-do-campo, pica-chanchã, pichanchã, pica-pau-amarelo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Celeus flavescens (Gmelin, 1788)

[pica-pau-de-cabeça-amarela], João-velho, pica-pau-amarelo, pica-pau-velho

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Dryocopus galeatus (Temminck, 1822)

[pica-pau-de-cara-acanelada]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)

[pica-pau-de-banda-branca], pica-pau-da-cabeça-vermelha

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818)

[pica-pau-rei], pica-pau-da-cabeça-vermelha

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

[*Campephilus melanoleucos* (Gmelin, 1788)]

[pica-pau-de-topete-vermelho]

ICP; FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

PASSERIFORMES

THAMNOPHILIDAE

Terenura maculata (Wied, 1831)¹⁴

[zidedê]

DA:ExD (MHNCI); FP:Naumburg (1939)

Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868

[papa-formiga-de-grota]

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1924)

Myrmotherula gularis (Spix, 1825)

[choquinha-de-garganta-pintada]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

¹⁴ Em alocação provisória (*incertae sedis*), segundo CBRO (2011).

Myrmotherula unicolor (Ménétriès, 1835)

[choquinha-cinzenta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Formicivora rufa (Wied, 1831)

[papa-formiga-vermelho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Stymphalornis acutirostris Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995

[bicudinho-do-brejo], tio-chico

DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (1995)

Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823)

[choquinha-de-peito-pintado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)

[choquinha-lisa]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Dysithamnus xanthopterus Burmeister, 1856

[choquinha-de-asa-ferrugem]

DA:ExD (MHNCI); FP:Naumburg (1939)

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868

[chororozinho-de-chapéu-preto]

DA:ExB (MZUSP); FP:Pinto & Camargo (1956)

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868

[chororozinho-de-bico-comprido]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 1822)

[chororozinho-de-asa-vermelha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Naumburg (1939)

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764)
[choca-barrada], corró
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816
[choca-de-chapéu-vermelho]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924
[choca-do-planalto]
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1995)

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816
[choca-da-mata], choca
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Taraba major (Vieillot, 1816)
[choró-boi], chorró
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816)
[chocão-carijó]
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Batara cinerea (Vieillot, 1819)
[matracão], papa-ovo
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Mackenziaena leachii (Such, 1825)
[borralhara-assobiadora], brujara-da-carijó
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823)
[borralhara], brujara-preta, brujara
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850)

[papo-branco]

DA:ExD (MHNCI); FP:Anjos & Bóçon (1992)

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)

[papa-taoca-do-sul], papa-guaju, papa-toca

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1924)

Drymophila ferruginea (Temminck, 1822)

[trovoada]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901)

[trovoada-de-bertoni]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906)

[choquinha-de-dorso-vermelho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Drymophila malura (Temminck, 1825)

[choquinha-carijó], choquinha-da-tranqueira

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Drymophila squamata (Lichtenstein, 1823)

[pintadinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

CONOPOPHAGIDAE

Conopophaga lineata (Wied, 1831)

[chupa-dente]

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1924)

Conopophaga melanops (Vieillot, 1818)

[chupa-dente-de-máscara-preta], chaspe

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube (1989)

GRALLARIIDAE

Grallaria varia (Boddaert, 1783)

[tovacuçu], sorová

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Hylopezus nattereri (Pinto, 1937)

[pinto-do-mato], tovaca-caneluda

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

RHINOCRYPTIDAE

Merulaxis ater Lesson, 1830

[entufado]

DA:ExB (MN); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Eleoscytalopus indigoticus (Wied, 1831)

[macuquinho], choca

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Scytalopus speluncae (Ménétrières, 1835)

[tapaculo-preto]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Scytalopus pachecoi Maurício, 2005

[tapaculo-ferreirinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Maurício *et al.* (2010)

Scytalopus iraiensis Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998

[macuquinho-da-várzea]

DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (1998)

Psilorhamphus guttatus (Ménétrières, 1835)

[tapaculo-pintado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Naumburg (1939)

FORMICARIIDAE

Formicarius colma Boddaert, 1783

[galinha-do-mato], pinto-do-mato

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)

[tovaca-campainha], codorninha, tovaca, sovaca, mocinha,
tovaquinha, galinhota, galinhola

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Chamaeza meruloides Vigors, 1825

[tovaca-cantadora]

DA:ExD (MHNCI); FP:Urban-Filho *et al.* (2001)

Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859)

[tovaca-de-rabo-vermelho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

SCLERURIDAE

Sclerurus scansor (Ménétrières, 1835)

[vira-folha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

DENDROCOLAPTIDAE

Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820)

[arapaçu-pardo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)

[arapaçu-verde], subideira

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)

[arapaçu-rajado], subideira-carijó

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1925)

Campylorhamphus trochilirostris (Lichtenstein, 1820)

[arapaçu-beija-flor], trepadeira

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822)

[arapaçu-de-bico-torto]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818)

[arapaçu-de-cerrado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859)

[arapaçu-escamado-do-sul]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Dendrocolaptes platyrostris spix, 1825

[arapaçu-grande], luzia-da-menor, meleiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)

[arapaçu-de-garganta-branca], luzia-da-grande

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

FURNARIIDAE

Xenops minutus (Sparrman, 1788)¹⁵

[bico-virado-miúdo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Xenops rutilans Temminck, 1821¹⁵

[bico-virado-carijó]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

¹⁵ Em alocação provisória (*incertae sedis*), segundo CBRO (2011).

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)

[joão-de-barro], joão-de-barro

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1925)

Phleocryptes melanops (Vieillot, 1817)

[bate-bico]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)

[joão-porca], beira-rio

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821)

[barranqueiro-de-olho-branco]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Hylocryptus rectirostris (Wied, 1831)

[fura-barreira]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816)

[trepador-coleira]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859

[limpa-folha-ocráceo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Philydor atricapillus (Wied, 1821)

[limpa-folha-coroado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1925)

Philydor rufum (Vieillot, 1818)

[limpa-folha-de-testa-baia]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885

[trepadorzinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823)

[limpa-folha-miúdo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832)

[trepador-quiete]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1859)

Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859)

[limpa-folha-do-brejo]

DA:ExB (MZUSP); FP:Pinto & Camargo (1956)

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830)

[trepador-sobrancelha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856)

[grimpeirinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1856)

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824)

[grimpeiro], grimpeirinho, piolhinho-do-sapé

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821)]

[joão-de-pau]

ICP; FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Phacellodomus striaticollis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)

[tio-tio]

DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817)

[graveteiro], garrinchão, graveteiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1995)

Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858)

[joão-botina-do-brejo]

DB:FoX (MAVV); RDB:FoP (Deconto & Vallejos, 2010);

FP:Simon *et al.* (2008)

Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 1859)

[cisqueiro], cisqueiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1859)

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)

[cochicho], pedreiro, cochicho

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)

[curutié], corruíra-do-banhado

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819

[pichororé], pichorolé, bentererê

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Synallaxis cinerascens Temminck, 1823

[pi-puí]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859

[petrim]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Synallaxis albescens Temminck, 1823

[uí-pi]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Synallaxis spixi Sclater, 1856
[joão-teneném], bentererê
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Synallaxis hypospodia Sclater, 1874
[joão-grilo]
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1991c)

[***Synallaxis albilora*** Pelzeln, 1856]
[joão-do-pantanal]
ICP; FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Cranioleuca vulpina Pelzeln, 1856
[arredio-do-rio]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853)
[arredio-oliváceo]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1859)

Cranioleuca pallida (Wied, 1831)
[arredio-pálido]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

PIPRIDAE

Pipra fasciicauda Hellmayr, 1906
[uirapuru-laranja], uirapuru
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Manacus manacus (Linnaeus, 1766)
[rendeira]
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809)
[tangarazinho], arco-íris
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)

[tangará], tangará, pitão

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)

[soldadinho]

DA:ExB (MZUSP); FP:Pinto & Camargo (1956)

TITYRIDAE

Oxyruncus cristatus Swainson, 1821

[araponga-do-horto], bombinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858)

[maria-leque-do-sudeste]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Myiobius barbatus (Gmelin, 1789)

[assanhadinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Myiobius atricaudus Lawrence, 1863

[assanhadinho-de-cauda-preta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1927)

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838)

[flautim]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Laniisoma elegans (Thunberg, 1823)]

[chibante]

ICP; FP:Anjos (1990)

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)

[anambé-branco-de-bochecha-parda], anambezinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Tityra cayana (Linnaeus, 1766)
[anambé-branco-de-rabo-preto], araponguinha, anambezinho
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816)
[caneleiro-verde]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827)
[caneleiro]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)
[caneleiro-preto]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823)
[caneleiro-bordado]
DB:AsP(VQP); RDB:AsI (XC-76783); ICP; FP:Straube & Urben-Filho (2007)

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823)
[caneleiro-de-chapéu-preto], zé-tigrinho
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

COTINGIDAE

Lipaugus lanioides (Lesson, 1844)
[tropeiro-da-serra]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
[araponga], araponga, guiraponga, guaraponga, garapomba, ferreiro
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792)

[pavó], pavão, pavõ, pavãozinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Carpornis cucullata (Swainson, 1821)

[corocochó], corocoxó, coricoxó, corocotéu

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Carpornis melanocephala (Wied, 1820)

[sabiá-pimenta], pião-batata

DB:AsP (FCS); FP:Straube *et al.* (2004)

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816

[tesourinha-da-mata]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

RHYNCHOCYCLIDAE

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846

[abre-asas-de-cabeça-cinza]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846

[cabeçudo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Corythopis delalandi (Lesson, 1830)

[estalador]

DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1924)

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822)

[barbudinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824)

[borboletinha-do-mato]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Phylloscartes kronei Willis & Oniki, 1992

[maria-da-restinga]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 1907

[não-pode-parar]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887)

[papa-moscas-de-olheiras]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907)

[estalinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Phylloscartes sylviolus (Cabanis & Heine, 1859)

[maria-pequena]

DA:ExD (MHNCI); FP:Parker & Goerck (1997)

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)

[bico-chato-de-orelha-preta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831)

[teque-teque], olho-de-boi

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)

[ferreirinho-relógio], sebinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846)

[tororó]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868)
[ferreirinho-de-cara-parda]
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1995)

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)
[miudinho]
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Hemitriccus diops (Temminck, 1822)
[olho-falso]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906)
[catraca]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831)
[tiririzinho-do-mato]
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831)
[tachuri-campainha]
DA:ExD (MHNCI); FP:Cory & Hellmayr (1927)

Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
[sebinho-de-olho-de-ouro]
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953)
[maria-catarinense]
DB:FoX (EE); FP:Buzzetti *et al.* (2003)

TYRANNIDAE

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)
[gibão-de-couro], birro
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831

[barulhento]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Tyranniscus burmeisteri Cabanis & Heine, 1859

[piolhinho-chiador]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)

[risadinha], caga-sebo

DA:ExD (MHNCI); FP:Temminck (1824)

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)

[guaracava-de-barriga-amarela], maria-dia

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868

[guaracava-grande], João-bobo

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868

[guaracava-de-bico-curto], tuque

DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)

[tuque], tuque

DB:AsP (MAVV); RDB:AsI (WA-247077); FP:Pelzeln (1871)

[*Elaenia cristata* Pelzeln, 1868]

[guaracava-de-topete-uniforme]

ICP; FP:Straube *et al.* (2005)

Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865

[guaracava-de-crista-branca]

DB:AsP (LRD); RDB:AsI (WA-222813); FP:Straube *et al.* (2005)

Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1859)

[tucão]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818)

[suiriri-cinzento]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Myiopagis caniceps (Swainson, 1835)

[guaracava-cinzenta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817)

[guaracava-de-crista-alaranjada]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823)

[marianinha-amarela]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Phaeomyias murina (Spix, 1825)

[bagageiro]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto *et al.* (1991)

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824)

[piolhinho-verdoso]

DA:ExD (MHNCI); FP:Berlepsch & Hellmayr (1905)

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)

[piolhinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862

[piolhinho-serrano]

DA:ExD (MHNCI); FP:Straube (1990)

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818)

[papa-moscas-do-campo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

[*Polystictus pectoralis* (Vieillot, 1817)]

[papa-moscas-canela]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1993a)

Pseudocolopteryx sclateri (Oustalet, 1892)

[tricolino]

DA:ExB (MCN)*; FP:Sick, 1997

Pseudocolopteryx flaviventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

[amarelinho-do-junco]

DA:ExB (MPEG)*; FP:Bornschein & Reinert (1997)

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817)

[joão-pobre], João-pobre

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)

[alegrinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 ¹⁶

[patinho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Platyrinchus leucoryphus Wied, 1831 ¹⁶

[patinho-gigante]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Piprites chloris (Temminck, 1822) ¹⁶

[papinho-amarelo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

¹⁶ Em alocação provisória (*incertae sedis*) segundo CBRO (2011), adota-se aqui o agrupamento inserido em posição adequada à lista anterior (CBRO, 2010).

Piprites pileata (Temminck, 1822) ¹⁶

[caneleirinho-de-chapéu-preto]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Tachuris rubrigastra (Vieillot, 1817) ¹⁶

[papa-piri]

DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (1993a)

Attila phoenicurus Pelzeln, 1868

[capitão-castanho], boiadeiro, viu-bem-te-vi

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1868)

Attila rufus (Vieillot, 1819)

[capitão-de-saíra], tinguau-mirim, capitão-de-saíra

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Legatus leucophaeus (Vieillot, 1818)

[bem-te-vi-pirata]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 1835)

[maria-cabeçuda]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859

[irré]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)

[maria-cavaleira]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776)

[maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818)

[gritador]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Casiornis rufus (Vieillot, 1816)

[maria-ferrugem]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

[bem-te-vi], bem-te-vi

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)

[suiriri-cavaleiro], bem-te-vi-cavaleiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)

[bem-te-vi-rajado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

[neinei], bem-te-vi

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Myiozetetes similis (Spix, 1825)

[bentevizinho-de-penacho-vermelho], bem-te-vi-do-pequeno,
bentevizinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

[suiriri], siriri, siri

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Tyrannus savana Vieillot, 1808

[tesourinha], tesourinha, tesoureiro, tesoura

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Tyrannus tyrannus (Linnaeus, 1766)

[suiriri-valente]

FoX (ACC); RDB:FoI (WA-231659); FP:Bornschein & Reinert (1997)

[Griseotyrannus aurantioatrocristatus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)]

[peitica-de-chapéu-preto]

ICP; FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Empidonomus varius (Vieillot, 1818)

[peitica]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Conopias trivirgatus (Wied, 1831)

[bem-te-vi-pequeno]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Colonia colonus (Vieillot, 1818)

[viuvinha], pito-de-velha

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776)

[filipe]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

[príncipe], sangue-de-boi, verão

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Fluvicola albiventer (Spix, 1825)

[lavadeira-de-cara-branca], lavadeira

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)

[lavadeira-mascarada]

DA:ExD (MHNLTs); FP:Scherer-Neto & Carrano (1998b)

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764)

[freirinha], cabeça-de-vô, viuvinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818)

[tesoura-do-brejo], tesoura-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816)

[galito], galito, galinho

DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831)

[guaracavuçu]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)

[enferrujado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Contopus cinereus (Spix, 1825)

[papa-moscas-cinzento]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Lessonia rufa (Gmelin, 1789)

[colegial]

DA:ExB (MN); FP:Bornschein *et al.* (1997)

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818)

[maria-preta-de-bico-azulado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Knipolegus lophotes Boie, 1828

[maria-preta-de-penacho], xexéu, maria-preta

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818)

[maria-preta-de-garganta-vermelha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789)

[viuvinha-de-óculos]

DA:ExB (MPEG)*; FP:Arruda & Lara (1992)

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)

[suiriri-pequeno], siriri-amarelo

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)

[primavera], pombinha-das-almas, noivinha, pombinha-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)

[noivinha-branca]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto *et al.* (1991)

[*Xolmis irupero* (Vieillot, 1823)]

[noivinha]

ICP; FP:Scherer-Neto (1980)

Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823)

[noivinha-de-rabo-preto]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Muscipira vetula (Lichtenstein, 1823)

[tesoura-cinzenta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)

[pitiguari], elvira, pedro-vira, vite-vite, gente-de-fora-vem

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)
[juruviara], juruviara, jiruviara, juruvira
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822
[verdinho-coroadado]
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 1835)
[vite-vite-de-olho-cinza]
DA:ExD (MHNCI); FP:Raposo *et al.* (1998)

CORVIDAE

Cyanocorax cyanomelas (Vieillot, 1818)
[gralha-do-pantanal]
ICP; FP:Scherer-Neto (1983)

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818)
[gralha-azul], gralha-azul, acaem
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1856)

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)
[gralha-do-campo]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818)
[gralha-picaça], gralha-amarela, gralha-picaça, gralha-branca,
gralha-de-peito-branco, gralha-do-mato
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

HIRUNDINIDAE

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)
[andorinha-pequena-de-casa], andorinha
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

[*Pygochelidon melanoleuca* (Wied, 1820)]

[andorinha-de-coleira]

ICP; FP:Straube *et. al.* (2001)

***Alopochelidon fucata* (Temminck, 1822)**

[andorinha-morena]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[*Atticora tibialis* (Cassin, 1853)]

[calcinha-branca]

ICP; FP:Straube & Bornschein (1995)

***Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot, 1817)**

[andorinha-serradora], andorinha-do-barranco, andorinha-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

***Progne tapera* (Vieillot, 1817)**

[andorinha-do-campo], andorinha-parda

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

***Progne subis* (Linnaeus, 1758)**

[andorinha-azul]

DB:FoX (WC); RDB:FoI (WA-277436); FP:Steffan (1974)

***Progne chalybea* (Gmelin, 1789)**

[andorinha-doméstica-grande], andorinha-do-verão, andorinha-da-grande

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

[*Progne elegans* Baird, 1865)]

[andorinha-do-sul]

ICI¹⁷; FP:não há

¹⁷ Em 17 de setembro de 2002, F.C.Straube observou dois indivíduos nas adjacências das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Há numerosos registros para o Parque Nacional de Iguazú (Misiones, Argentina), adicionados às observações de vários ornitólogos argentinos (A.Giraudó, J.Baldo, P.Cano e

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)

[andorinha-do-rio], andorinha-do-rio

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)

[andorinha-de-sobre-branco], andorinha-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

[*Tachycineta leucopyga* (Meyen, 1834)]

[andorinha-chilena]

ICP; FP:Bornschein & Reinert (1997)

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

[andorinha-do-barranco]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

[andorinha-de-bando], andorinha-do-verão

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817)

[andorinha-de-dorso-acanelado]

DB:FoX (LRD); RDB:FoI (WA-299151); FP:Scherer-Neto (1980)

TROGLODYTIDAE

Troglodytes musculus Naumann, 1823

[corruíra], curruíra, corruíra, cambaxirra

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

C.Saibene *apud*. Chebez, 1996) no mesmo local ou imediações; ali mesmo, três indivíduos foram observados por F.C.Straube e E.Militello (16 de setembro de 2002) sobrevoando o Rio Iguaçu, nas proximidades do mirante da Garganta do Diabo.

Cistothorus platensis (Latham, 1790)

[corruíra-do-campo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

[*Campylorhynchus turdinus* (Wied, 1831)]

[catatau]

ICP; FP:Bencke *et al.* (2008)

Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845)

[garrinchão-de-barriga-vermelha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819)

[garrinchão-de-bico-grande], corruíra-do-varjão, corruirão-do-mato-virgem, corruiruçu

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

DONACOBIIDAE

Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)

[japacanim], assobia-cachorro

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

POLIOPTILIDAE

Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819

[bico-assovelado], chiririto

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Polioptila lactea Sharpe, 1885

[balança-rabo-leitoso]

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

TURDIDAE

Turdus flavipes Vieillot, 1818

[sabiá-una], sabiá-preta, sabiá-una, sabiúna

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Turdus rufiventris Vieillot, 1818

[sabiá-laranjeira], sabiá-vermelha, sabiá-laranjeira, sabiá-peito-roxo, sabiá-laranja, sabiá-do-peito-vermelho

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Turdus leucomelas Vieillot, 1818

[sabiá-barranco], sabiá-branca, sabiá-parda

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850

[sabiá-poca], sabiá-branca, sabiá-poca, sabiá-da-branca

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Turdus subalaris (Seeböhm, 1887)

[sabiá-ferreiro], sabiá-correntina, sabiá-ferreira, sabiá-correntinha, sabiá-azulzinha, azulzinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Turdus albicollis Vieillot, 1818

[sabiá-coleira], sabiá-coleira

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

MIMIDAE

[*Mimus gilvus* (Vieillot, 1807)]

[sabiá-da-praia]

ICP; FP:Bornschein *et al.* (1997)

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)

[sabiá-do-campo], sabiá-do-campo, terço

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Mimus triurus (Vieillot, 1818)

[calhandra-de-três-rabos]

DB:FoX (RC); RDB:FoI (WA-47334); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

MOTACILLIDAE

Anthus lutescens Pucheran, 1855

[caminheiro-zumbidor], caminheiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

[***Anthus correndera*** Vieillot, 1818]

[caminheiro-de-espora]

ICP; FP:Krul & Moraes (1993b)

Anthus nattereri Sclater, 1878

[caminheiro-grande]

DA:ExB (MZUSP); FP:Sztolcman (1926)

Anthus hellmayri Hartert, 1909

[caminheiro-de-barriga-acanelada], caminheiro

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

COEREVIDAE

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

[cambacica], sebinho, cambacica

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

THRAUPIDAE

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800)

[pimentão], bico-de-pimenta, bico-pimenta

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837

[trinca-ferro-verdadeiro], trinca-ferro, para-pelote, papa-banana, tico-tico-bravo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Saltator maxillosus Cabanis, 1851

[bico-grosso], trinca-ferro-de-bico-grosso

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817)

[bico-de-pimenta]

DB:FoX (EC); FP:Carrano & Ribas (2000)

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839)

[sanhaçu-pardo], sanhaçu-pardo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817)

[bico-de-veludo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788)

[tietinga], tié-tinga, languageiro, maria-branca

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823)

[cigarra-do-campo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto *et al.* (1991)

Nemosia pileata (Boddaert, 1783)

[saíra-de-chapéu-preto]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819)

[catirumbava], jacinto, sanhaço-amarelo

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

[saí-canário]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Pyrrhocomma ruficeps (Strickland, 1844)

[cabecinha-castanha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831)

[bandoleta]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto *et al.* (1991)

Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818)

[tiê-de-topete], sanhaçu-angorá, tié-de-bando

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Eucometis penicillatus (Spix, 1825)

[pipira-da-taoca]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Tachyphonus cristatus (Linnaeus, 1766)

[tiê-galo], tié-galo

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)

[tiê-preto], tié, tié-preto (macho), tié-pardo (fêmea), tietê, chópe

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

[Tachyphonus rufus] (Boddaert, 1783)]

[pipira-preta]

ICP; FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)

[pipira-vermelha], bico-de-prata

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766)

[tiê-sangue], sangue-de-boi, tié-sangue

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)

[sanhaçu-cinzento], sanhaçu

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817)
[sanhaçu-de-encontro-azul], sanhaçu
DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Thraupis ornata (Sparman, 1789)
[sanhaçu-de-encontro-amarelo]
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Thraupis palmarum (Wied, 1823)
[sanhaçu-do-coqueiro], sanhaçu-da-palmeira, sanhaçu-verde
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Thraupis bonariensis (Gmelin, 1789)
[sanhaçu-papa-laranja], sanhaçu-da-laranja, sairão, papa-laranja
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823)
[sanhaçu-frade], cabeça-de-velho, sanhaçu-frade, veinha
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819)
[saíra-viúva], viúva
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Tangara seledon (Statius Muller, 1776)
[saíra-sete-cores], sete-cores, saíra-de-sete-cores
DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Tangara cyanocephala (Statius Muller, 1776)
[saíra-militar], saíra-de-lenço, saíra-sete-cores, saíra-lenço
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Tangara desmaresti (Vieillot, 1819)
[saíra-lagarta], saíra-da-serra, saíra-verde
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Tangara cayana (Linnaeus, 1766)

[saíra-amarela]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Tangara peruviana (Desmarest, 1806)

[saíra-sapucaia], saíra-guaçu

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto (1944)

Tangara preciosa (Cabanis, 1850)

[saíra-preciosa], saíra-verde

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Tersina viridis (Illiger, 1811)

[saí-andorinha], saíra-andorinha, tório

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Dacnis nigripes Pelzeln, 1856

[saí-de-pernas-pretas]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)

[saí-azul], saíra-azul

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758)

[saí-verde], saíra-tucano

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)

[saíra-de-papo-preto], gaturamo

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818)

[saíra-ferrugem]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)

[figuinha-de-rabo-castanho]

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Conirostrum bicolor (Vieillot, 1809)

[figuinha-do-mangue]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

EMBERIZIDAE

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)

[tico-tico], tico-tico, tijitica, jítica, jetica, tica, pardais

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

[tico-tico-do-campo], tico-tico-rato, tico-tico-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851

[cigarra-bambu], viuvinha, cigarrinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817)

[tico-tico-do-banhado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835)

[peito-pinhão]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

[quem-te-vestiu]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Poospiza cabanisi (Bonaparte, 1850)

[tico-tico-da-taquara], tico-tico-da-taquara, guexe

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Sicalis citrina Pelzeln, 1870

[canário-rasteiro], canário-da-pedreira, canário-do-lajeado

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

[canário-da-terra-verdadeiro], canarinho, canário-terra, canário-da-terra, terrinha, boquelo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Sicalis luteola (Sparman, 1789)

[típico], canário-pardo, canário-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)

[canário-do-campo], tibirro-do-campo

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907

[canário-do-brejo]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Embernagra platensis (Gmelin, 1789)

[sabiá-do-banhado]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

[tiziu], tiziu

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)

[pixoxó], pixoxó

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820)

[cigarra-verdadeira], serra-serra, cigarrinha

DA:ExD (MHNCI); Collar *et al.* 1992

Sporophila plumbea (Wied, 1830)
[patativa], patativa, patativa-do-campo, azulega
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)
[coleiro-do-brejo], coleiro-do-brejo
DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)
[bigodinho], bigodinho, estrelinha
DA:ExD (MHNCI); FP:Anjos & Seger (1988)

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)
[baiano], coleiro-baiano
DA:ExE (MNB) *; FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
[coleirinho], coleirinho, coleiro, coleira, papa-capim
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817)
[chorão], patativa-chorona
DB:FoX (EC); FP:Straube *et al.* (2004)

Sporophila pileata (Sclater, 1864)
[caboclinho], caboclinho, caboclinho-coroadado
DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto *et al.* (1994)

Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851
[caboclinho-de-barriga-vermelha], caboclinho-vermelho
DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Sporophila palustris (Barrows, 1883)
[caboclinho-de-papo-branco]
FoX (EC); FP:Straube *et al.* (1994)

Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)
[caboclinho-de-chapéu-cinzento], caboclinho-café, caboclinho-vermelho-coroado

DA:ExD (MHNCI); FP:Carrano & Ribas (2000)

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
[caboclinho-de-barriga-preta], caboclinho-preto

DA:ExE (NMW) *; FP:Pelzeln (1871)

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)
[curió], curió

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Tiaris fuliginosus (Wied, 1830)
[cigarra-do-coqueiro], tiziu-da-taboca

DA:ExD (MHNCI); FP:Bornschein *et al.* (1993)

Arremon semitorquatus Swainson, 1838
[tico-tico-do-mato]

DA:ExD (MHNCI); FP:Patricial (2010)

Arremon flavirostris Swainson, 1838
[tico-tico-de-bico-amarelo], tico-tico-do-mato

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Coryphas piza melanotis (Temminck, 1822)
[tico-tico-de-máscara-negra]

DA:ExD (MHNCI); FP:não há

Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776)
[tico-tico-rei], tico-tico-rei, sangue-de-boi, sanguinho-de-boi, sanguinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Paroaria coronata (Miller, 1776)
[cardeal], cardeal

DB:FoX (EP); RDB:FoI (WA-190547); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Paroaria capitata (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
[cavalaria], cardeal, galo-da-campina
DA:ExD (MHNCI); FP:Straube & Bornschein (1995)

CARDINALIDAE

Piranga flava (Vieillot, 1822)
[sanhaçu-de-fogo], sangue-de-boi
DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Habia rubica (Vieillot, 1817)
[tiê-do-mato-grosso], passarinho-de-quati, tiê-de-bando
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Cyanoloxia moesta (Hartlaub, 1853)
[negrinho-do-mato]
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823)
[azulão], azulão
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
[azulinho], azulito
DA:ExD (MHNCI); FP:Hartert & Venturi (1909)

PARULIDAE

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)
[mariquita]
DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Dendroica striata (Forster, 1772)]
[mariquita-de-perna-clara]
ICP; FP: Carrano & Ribas (2000)

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)

[pia-cobra], caga-sebo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)

[pula-pula], bispo

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Basileuterus flaveolus (Baird, 1865)

[canário-do-mato], canário-do-mato

DA:ExD (MHNCI); FP:Raposo *et al.* (1994)

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817)

[pula-pula-assobiador], flautinha

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

[***Basileuterus leucophrys*** Pelzeln, 1868]

[pula-pula-de-sobrancelha]

ICP; FP:Straube *et al.* (2004)

Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821)

[pula-pula-ribeirinho], varre-bosta, canarinho-do-rio

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

ICTERIDAE

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769)

[japuguaçu], japu

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Procacicus solitarius (Vieillot, 1816)

[iraúna-de-bico-branco]

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825)

[tecelão], inhapim, nhapim, japuíra

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766)

[guaxe], guaxe, guaxo

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819)

[encontro], melro, merro, rouxinol

DA:ExD (MHNCI); FP:Hellmayr (1937)

Icterus croconotus (Wagler, 1829)

[joão-pinto], corrupeção

DB:FoX (AG); RDB:FoI (WA-248060); FP:Scherer-Neto *et al.* (2008)

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

[graúna], pássaro-preto, passo-preto, chupim. chopim

DA:ExD (MHNCI); FP:Chrostowski (1912)

Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786)

[cardeal-do-banhado]

DA:ExB (MCN)*; FP:Bornschein & Reinert (2000)

Agelasticus cyanopus (Vieillot, 1819)

[carretão]

DA:ExD (MHNCI); Pinto (1944)

Agelasticus thilius (Molina, 1782)

[sargento]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)

[garibaldi], garibaldi

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)

[chopim-do-brejo], chupim-do-brejo, chupim-do-banhado, chopim-preto-e-amarelo

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Agelaioides badius (Vieillot, 1819)

[asa-de-telha]

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866

[vira-bosta-picumã]

DA:ExB (MN); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)

[iraúna-grande], graúna

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)

[vira-bosta], chupim, chopim, virabosta

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)

[polícia-inglesa-do-sul], polícia-inglesa

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

[Dolychonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758)]

[triste-pia]

ICP; FP:Anjos & Graf (1993)

FRINGILLIDAE

Sporagra magellanica (Vieillot, 1805)

[pintassilgo], pintassilgo, pintassilga, pintassilva

DA:ExD (MHNCI); FP:Pelzeln (1871)

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)

[fim-fim], vem-vem, gaturamo, tietê

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)

[gaturamo-verdadeiro], gaturamo, bonito-lindo, tietê, gaturamo-pequeno, gaturamo-do-pequeno

DA:ExD (MHNCI); FP:Pinto & Camargo (1956)

Euphonia chalybea (Mikan, 1825)

[cais-cais], gaturamo-gaviãozinho, gaturamo-grande, gaturamo-do-grande

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818)

[gaturamo-rei], sãopaulinho

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

Euphonia pectoralis (Latham, 1801)

[ferro-velho], chicharro, tietê-curió, arcade

DA:ExD (MHNCI); FP:Ihering & Ihering (1907)

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)

[gaturamo-bandeira], gaturamo-verde, canário-de-assobio

DA:ExD (MHNCI); FP:Sztolcman (1926)

ESTRILDIDAE

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)

[bico-de-lacre], bico-de-lacre

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

PASSERIDAE

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

[pardal], pardal, pardais

DA:ExD (MHNCI); FP:Scherer-Neto (1980)

LISTA TERCIÁRIA

Para as espécies abaixo indicadas há menções na literatura sobre ocorrência no Estado do Paraná, sejam com base em interpolações baseadas por continuidade de distribuição em obras de referências (inclusive eventuais equívocos de interpretações dessas fontes), sejam oriundas de registros alegadamente obtidos que, embora constituir-se-iam de ampliações de distribuição, carecem - nas fontes originais - de maiores detalhes sobre os respectivos flagrantes (*vide* Straube, 2005).

Via de regra, a menção a essas espécies é oriunda de extrapolações inadequadas ou de registros que, após avaliação crítica, mostraram-se atribuíveis a outros táxons biogeograficamente compatíveis com o território paranaense ou cujos registros ainda não foram satisfatoriamente discutidos ou circunstanciados.

As fontes originais constituem-se das primeiras (e muitas vezes únicas) fontes que atribuem a presença da espécie para o Paraná, sendo que em certas situações deflagraram “erros em cascata”, em virtude da não aplicação de juízo, que aqui recebe idêntico critério aplicado para as listas primária e secundária. Ao tempo em que tais registros estão disponíveis na literatura, também as anotações críticas publicadas sobre a validade dos mesmos (eventualmente implícita) é relevante e, no presente trabalho, a indicação de tais menções está apresentada, quando existente.

TINAMIFORMES

TINAMIDAE

Crypturellus soui (Hermann, 1783)

FP:Scherer-Neto (1983: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789)

FP:Scherer-Neto (1983: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

ANSERIFORMES

ANATIDAE

Cygnus melancoryphus (Molina, 1782)

FP:Scherer-Neto (1980: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

Oxyura vittata (Philippi, 1860)

FP:Scherer-Neto (1985: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

GALLIFORMES

CRACIDAE

Aburria cumanensis (Jacquin, 1784)

FP:Sick (1985: *cf.* Straube *et al.* (1996)

PROCELLARIIFORMES

DIOMEDEIDAE

Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822)

FP:Scherer-Neto (1983: *cf.* Roos & Piacentini, 2003)

Phoebetria palpebrata (Forster, 1785)

FP:Scherer-Neto (1983: *cf.* Roos & Piacentini, 2003)

Diomedea epomophora Lesson, 1825

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

PROCELLARIIDAE

Lugensa brevirostris (Lesson, 1831)

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Pachyptila desolata (Gmelin, 1789)

FP:Scherer-Neto (1980)

HYDROBATIDAE

Fregetta grallaria (Vieillot, 1818)

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Fregetta tropica (Gould, 1844)

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Oceanodroma castro (Harcourt, 1851)

FP:Scherer-Neto (1980)

PELECANIFORMES

ARDEIDAE

Ardea herodias Linnaeus, 1758

FP:Sztolcman (1926 *cf.* CBRO, 2001a:44)

CATHARTIFORMES

CATHARTIDAE

Vultur gryphus Linnaeus, 1758

FP:Straube *et al.* (1991)

FALCONIFORMES

FALCONIDAE

Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817)

FP:Sztolcman (1926: *cf.* Straube *et al.*, 2005)

Falco deiroleucus Temminck, 1825

FP:Pinto (1978)

CARIAMIFORMES

CARIAMIDAE

Chunga burmeisteri (Hartlaub, 1860)

FP: Sick (1985)

CHARADRIIFORMES

SCOLOPACIDAE

Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)

FP: Scherer-Neto & Straube (1995)

STERNIDAE

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)

FP: Scherer-Neto (1980)

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Patagioenas maculosa (Temminck, 1813)

FP: Anjos & Graf (1983: *cf.* Ghizoni *et al.*, 2009)

PSITTACIFORMES

PSITTACIDAE

Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790)

FP: Scherer-Neto (1985: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

Anodorhynchus glaucus (Vieillot, 1816)

FP: Straube (1988: *cf.* Straube *et al.*, 2005)

Aratinga nenday (Vieillot, 1823)

FP: Acervo Wikiaves (*cf.* Straube *et al.* (2009)

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)

FP: L. Chiyo e I. Schneiberg (2011, *in litt.*: *cf.* Straube *et al.*, 2009)

Amazona pretrei (Temminck, 1830)

FP: Collar *et al.* (1992 *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

STRIGIFORMES

STRIGIDAE

Bubo virginianus (Gmelin, 1788)

FP:Scherer-Neto (1980: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

CAPRIMULGIFORMES

NYCTIBIIDAE

Nyctibius grandis (Gmelin, 1789)

FP:Stefan (1975: *cf.* Bornschein & Reinert, 2000)

CAPRIMULGIDAE

Hydropsalis maculicauda (Lawrence, 1862)

FP:Stefan (1975: *cf.* Bornschein & Reinert, 2000)

APODIFORMES

APODIDAE

Tachornis squamata (Cassin, 1853)

FP:Scherer-Neto & Straube (1995: *cf.* Pichorim & Bornschein, 2001)

TROCHILIFORMES

TROCHILIDAE

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)

FP:Grantsau (1988: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

Colibri coruscans (Gould, 1846)

FP:Stefan (1975: *cf.* Bornschein & Reinert, 2000)

TROGONIFORMES

TROGONIDAE

Trogon curucui Linnaeus, 1766

FP:Scherer-Neto (1983: *cf.* Scherer-Neto & Straube (1995)

GALBULIFORMES

BUCCONIDAE

Monasa nigrifrons (Spix, 1824)

FP:Scherer-Neto (1980)

PICIFORMES

PICIDAE

Campephilus leucopogon (Valenciennes, 1826)

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

PASSERIFORMES

THAMNOPHILIDAE

Willisornis poecilinotus (Cabanis, 1847)

FP:Rodrigues *et al.* (1981)

FURNARIIDAE

Schoeniophylax phryganophilus (Vieillot, 1817)

FP:Ihering & Ihering (1907: *cf.* Kaminski & Carrano, 2006)

Automolus rufipileatus (Pelzeln, 1859)

FP:Rodrigues *et al.* (1981)

TITYRIDAE

Pachyramphus rufus (Boddaert, 1783)

FP:Scherer-Neto (1980)

PIPRIDAE

Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853)

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

COTINGIDAE

Tijuca atra Ferrusac, 1829

FP:Scherer-Neto (1980)

RHYNCHOCYCLIDAE

Rhynchocyclus olivaceus (Temminck, 1820)

FP:Scherer-Neto (1985: *cf.* Scherer-Neto & Straube, 1995)

TYRANNIDAE

Elaenia chilensis Hellmayr, 1927

FP:Scherer-Neto & Straube (1995)

Sublegatus modestus (Wied, 1831)

FP:Sztolcman (1926: *cf.* Straube *et al.*, 2005)

Alectrurus risora (Vieillot, 1824)

FP:Scherer-Neto (1980)

CORVIDAE

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821)

FP:Scherer-Neto (1983)

POLIOPTILIDAE

Polioptila dumicola (Vieillot, 1817)

FP:Scherer-Neto (1980: *cf.* Straube *et al.*, 2009)

TURDIDAE

Turdus fumigatus Lichtenstein, 1823

FP:Acervo Wikiaves

THRAUPIDAE

Saltator maximus (Statius Müller, 1776)

FP:Stefan (1975: *cf.* Bornschein & Reinert, 2000)

Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766)

FP:Scherer-Neto (1980)

EMBERIZIDAE

Arremon taciturnus (Hermann, 1783)

FP:Scherer-Neto (1980: *cf.* Patrial, 2010)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anjos, L.dos & Bócon, R. 1992. Primeiros registros de *Biatas nigropectus* no estado do Paraná. **I Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R53.
- Anjos, L.dos & Ferreira, A.R.J. 1998. Registros de campo de *Hylocharis sapphirina* e *H.cyanus* na região de Londrina, norte do Estado do Paraná, sul do Brasil (Trochiliformes: Trochilidae). **Ararajuba** 6(1):51.
- Anjos, L.dos & Graf, V. 1993. Riqueza de aves da Fazenda Santa Rita, região dos Campos Gerais, Palmeira, Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** 10(4):673-698.
- Anjos, L. dos & Schuchmann, K-L. 1997. Biogeographical affinities of the avifauna of the Tibagi River Basin, Parana Drainage System, southern Brazil. **Ecotropica** 3:43-65.
- Anjos, L.dos & Seger, C. 1988. Análise da distribuição das aves em um trecho do rio Paraná, divisa entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. **Arquivos de Biologia e Tecnologia** 31(4):603-612.
- Anjos, L.dos. 1990. Distribuição de aves em uma floresta de araucária da cidade de Curitiba (sul do Brasil). **Acta Biológica Paranaense** 19(1,2,3,4):51-63.
- AOU (American Ornithologists' Union). 1983. **Check-list of North american Birds**. 7a. edição. Washington, EUA: American Ornithologists' Union. Disponível online em <http://www.aou.org>.
- Arruda, S.D. & Lara, A.I. 1992. Viuvinha-de-óculos *Hymenops perspicillata* (Tyrannidae) no estado do Paraná, Brasil. **II Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R63.
- Barnett, J.M.; Minns, J. & Kirwan, G. & Remold, H. 2004. Informações adicionais sobre as aves dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. **Ararajuba** 12(1):55-58.
- Bencke, G.A.; Dias, R.A. & Fontana, C.S. 2008. Observações ornitológicas relevantes no Parque Nacional do Iguaçu e arredores, incluindo o primeiro registro de *Campylorhynchus turdinus* para o Paraná. **Atualidades Ornitológicas** 145:6-7.
- Bornschein, M.R. 2001. **Formações pioneiras do litoral centro-sul do Paraná: identificação, quantificação e caracterização ornitofaunística**. Curitiba, Curso de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná. 194 p.

- Bornschein, M.R. & Reinert, B.L. 2000. Avifauna de três remanescentes florestais do norte do Estado do Paraná, com sugestões para a conservação e manejo. **Revista Brasileira de Zoologia** **17**(3):615-636.
- Bornschein, M.R. & Straube, F.C. 1991. Novos registros de alguns Accipitridae nos estados do Paraná e Santa Catarina (sul do Brasil). **Encuentro de Ornitología de Paraguay, Brasil y Argentina, Resúmenes**, p.38.
- Bornschein, M.R.; Maurício, G.N. & Sobânia, R.L.M. 2004. First records of the Silvery Grebe *Podiceps occipitalis* Garnot, 1826 in Brazil. **Ararajuba** **12**(1):61-63.
- Bornschein, M.R.; Pichorim, M.; Reinert, B.L. & Straube, F.C. 1993b. Notas sobre algumas aves pouco comuns no sul do Brasil. **Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata, Resúmenes**, p.34.
- Bornschein, M.R.; Reinert, B.L. & Pichorim, M. 1993a. Aves dos campos e banhados do litoral do estado do Paraná. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resúmenes P26.
- Bornschein, M.R. & Reinert, B.L. 1997. Acrescido de marinha em Pontal do Paraná: uma área a ser conservada para a manutenção das aves dos campos e banhados do litoral do Paraná, sul do Brasil. **I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Anais**, Volume II: Trabalhos técnicos, p.875-889.
- Bornschein, M.R.; Reinert, B.L. & Pichorim, M. 1997. Notas sobre algumas aves novas ou pouco conhecidas no sul do Brasil. **Ararajuba** **5**(1):53-59.
- Bornschein, M.R.; Reinert, B.L. & Pichorim, M. 1998. Descrição, ecologia e conservação de um novo *Scytalopus* (Rhinocryptidae) do sul do Brasil, com comentários sobre a morfologia da família. **Ararajuba** **6**(1):3-36.
- Bornschein, M.R.; Straube, F.C.; Reinert, B.L. & Pichorim, M. 1993a. Novos registros de aves para a Floresta Atlântica paranaense. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resúmenes R44.
- Buzzetti, D.R.C.; Barnett, J.M. & Kirwan, G.F. 2003. Kaempfer's Tody-tyrant *Hemitriccus kaempferi*. **Cotinga** **20**: 95-96.
- Carlos, C.J.; Straube, F.C. & Pacheco, J.F. 2010. Conceitos e definições sobre documentação de registros ornitológicos e critérios para a elaboração de listas de aves para os estados brasileiros. **Revista Brasileira de Ornitologia** **18**(4):355-361.
- Carrano, E. & Jablonski, E.F. 1997. Notas sobre a ocorrência da andorinha-do-mar-negra *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758)

- (Aves-Laridae) para o Estado do Paraná, Brasil. **Estudos de Biologia** 41:33-36.
- Carrano, E. & Ribas, C.F. 2000. Novos registros de aves para a região de cerrado no Paraná. **Atualidades Ornitológicas** 94:12-13.
- Carrano, E. & Scherer-Neto, P. 2000. Avifauna da Ilha Rasa, APA de Guaraqueçaba, Paraná. **Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia**, R114:275-276.
- Carrano, E.; Scherer-Neto, P. Ribas, C.F. & Klemann-Jr., L. 2001. Novos registros de Falconiformes pouco comuns para os estados do Paraná e Santa Catarina. In: F.C.Straube ed. **Ornitologia sem fronteiras**, incluindo os Resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia (Curitiba, 22-27 de julho de 2001), Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. R169, p. 169-170.
- CBRO. 2001a. Resolução nº 32. Incluir *Ardea herodias* Linnaeus, 1758 na lista secundária de aves brasileiras, inserindo-a imediatamente após *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758. **Nattereria** 2:44.
- CBRO. 2001b. Recomendação nº 9. **Nattereria** 2:81.
- CBRO. 2011. **Lista das aves do Brasil**. 10º edição, 25 de janeiro de 2011. Disponível online em <http://www.cbro.org.br>.
- Chebez, J.C. 1996. **Fauna misionera**: catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la Provincia de Misiones (Argentina). Buenos Aires, Lola. 318 pp.
- Chrostowski, T. 1912. Kolekcja ornitologiczna ptaków paranskich. **Comptes Rendus de la Société Scientifique de Varsovie** [Sprawozdan z Posiedzen Towarzystwa Naukowego Warszawskiego] 5:452-500.
- Cory, C.B. & Hellmayr, C.E. 1924. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 3. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(223).
- Cory, C.B. & Hellmayr, C.E. 1925. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 4. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(234).
- Cory, C.B. & Hellmayr, C.E. 1927. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 5. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(242).

- Cory, C.B. 1918. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 2, n° 1. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(197).
- Cory, C.B. 1919. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 2, n° 2. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(203).
- Deconto, L.R. & Vallejos, M.A.V. 2010. *Phacellodomus ferrugineigula* (Pelzeln, 1858) e comentários sobre sua distribuição no sul do Brasil. **Atualidades Ornitológicas** 157:10-11.
- Farias, G.B. de & Alves, A.G.C. 2007. É importante pesquisar o nome local das aves? **Revista Brasileira de Ornitologia** 15(3):403-408.
- Ghizoni-Júnior, I.R.; Franz, I.; Albuquerque, J.L.B.; Barcellos, A.; Hassdenteufel, C.B.; Arend, F.L. & Martins-Ferreira, C. 2009. Registro da pomba-do-orvalho *Patagioenas maculosa* (Aves: Columbidae) no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. **Biotemas** 22(2):195-197.
- Hartert, E e S. Venturi (1909) Notes sur les oiseaux de la République Argentine. **Novitates Zoologicae** 16:159-267.
- Hellmayr, C.E. 1929. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 6. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(266).
- Hellmayr, C.E. 1934. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 7. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(330).
- Hellmayr, C.E. 1935. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 8. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(347).
- Hellmayr, C.E. 1936. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 9. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(365).
- Hellmayr, C.E. 1937. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 10. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(381).
- Hellmayr, C.E. 1938. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 11. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(430).
- Hellmayr, C.E. & Conover, B. 1942. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 1, n° 1. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(514).

- Helmayr, C.E. & Conover, B. 1948a. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 1, n° 2. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(615).
- Helmayr, C.E. & Conover, B. 1948b. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 1, n° 3. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(616).
- Helmayr, C.E. & Conover, B. 1949. **Catalogue of birds of the americas** [...]. Parte 1, n° 4. Chicago, Field Museum of Natural History. Publications of the Field Museum of Natural History, Zoological Series 13(634).
- Hinkelmann, C. e Fiebig, J. 2001. An early contribution to the avifauna of Paraná, Brazil. The Arkady Fiedler expedition of 1928/29. **Bulletin of the British Ornithologists' Club** 121(2):116-127.
- Ihering, H. von. 1904. O Rio Juruá. **Revista do Museu Paulista** 6:385-460.
- Ihering, H. von & Ihering, R. von. 1907. **Catalogos da fauna brasileira editados pelo Museu Paulista, S.Paulo – Brazil. Volume I: As aves do Brazil**. São Paulo, Tipografia do Diário Oficial. 485 pp.
- Kaminski, N. & Carrano, E. 2006. Avifauna da Serra do Cabral e áreas adjacentes, Tijucas do Sul, Paraná. **Estudos de Biologia** 28(64):119-128.
- Krul, R. & Moraes, V.S. 1993a. Mortandades de aves marinhas em um eixo de praia arenosa do litoral do Paraná. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R25.
- Krul, R. & Moraes, V. dos S. 1993b. Adendas a ornitofauna paranaense e registros de aves pouco conhecidas. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos P47.
- Krul, R. & Moraes, V.S. 1994a. Caracterização da avifauna de Pontal do Sul, litoral do Paraná. **IV Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos, p.37.
- Krul, R. & Moraes, V.dos S. 1994b. *Calonectris diomedea* (Procellariiformes, Procellariidae) no litoral do Paraná. **IV Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos, p.105.
- Lanzer, M.; Vallejos, M.A.V.; Aurélio-Silva, M. 2009. Primeiro registro documentado do tauató-pintado *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824) no Estado do Paraná, sul do Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia** 17(2): 137-138.

- Lara, A.I. 1992. Registros de *Netta peposaca* e *N.erythrophthalma* para o estado do Paraná. **II Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R52.
- Maurício, G.N. 2005. Taxonomy and southern populations in the *Scytalopus speluncae* group, with description of a new species and remarks on the systematics and biogeography of the complex (Passeriformes: Rhinocryptidae). **Ararajuba** **13**(1):7-28.
- Maurício, G.N.; Bornschein, M.R.; Vasconcelos, M.F. de; Whitney, B.M.; Pacheco, J.F. & Silveira, L.F. 2010. Taxonomy of “Mouse-colored Tapaculos”. I. On the application of the name *Malacorhynchus speluncae* Ménériès, 1835 (Aves: Passeriformes: Rhinocryptidae). **Zootaxa** **2518**:32-48.
- Mlikovsky, J. 2009. Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland, part 3: South American Birds. **Journal of National Museum (Prague) Natural History Sciences** **178**(5):17-180.
- Moraes, V. dos S. 1991a. Avifauna da Ilha do Mel, litoral do Paraná. **Arquivos de Biologia e Tecnologia** **34**(2):195-205.
- Moraes, V. dos S. & Krul, R. 1993a. Aves associadas a ecossistemas marinhos nos limites paranaenses. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R40.
- Moraes, V. dos S. & Krul, R. 1993b. Mortandades de aves marinhas em um eixo de praia arenosa do litoral do Paraná. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R25.
- Moraes, V. dos S. & Krul, R. 1994. Sobre as gaivotas-rapineiras *Catharacta antarctica* e *C.maccormickii* (Stercorariidae) no Paraná. **IV Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos, p.151.
- Moraes, V. dos S. & Krul, R. 1995. Aves associadas a ecossistemas de influência marítima no litoral do Paraná. **Arquivos de Biologia e Tecnologia** **38**(1):121-134.
- Moraes, V. dos S. & Krul, R. 1996a. *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) (Charadriiformes: Sternidae) no sul do Brasil. **V Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos p.75.
- Moraes, V. dos S. & Krul, R. 1997. Deslocamento de aves marinhas na costa brasileira: Expansão de limites de fronteira, rota migratória ou ocorrência accidental? **Resumos do VI Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Belo Horizonte, p.149.
- Naumburg, E.M.B. (1939). Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer:

- Formicariidae (part). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 76(6):231-276.
- Olmos, F. 2000. Revisão dos registros de *Stercorarius pomarinus* no Brasil, com notas sobre registros de *S.longicaudus* e *S.parasiticus* (Charadriiformes: Stercorariidae). **Nattereria** 1:29-33.
- Olmos, F. 2001. Revisão dos registros de *Procellaria conspicillata* no Brasil, com novas observações sobre sua distribuição. **Nattereria** 2:16-18.
- Parker III, T.A. e Goerck, J. 1997. The importance of national parks and biological reserves to bird conservation in the atlantic forest region of Brazil. **Ornithological Monographs** 48:527-541.
- Patrial, E.W. 2010. *Arremon semitorquatus* Swainson, 1838 (Passeriformes: Emberizidae) no norte do Paraná: novo registro documentado e comentários sobre sua distribuição geográfica meridional. **Atualidades Ornitológicas** 154:18-21
- Pelzeln, A. von. 1856. Über neue und wenig gekannte Arten der Kaiserlichen ornithologische sammlung, nebst Auszungen aus Joh.Natterer Handschriftlichen Katalog über die von ihm in Brasilien gesammelten species der familien Trogonidae und Alcedinidae. **Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien** 20:492-516
- Pelzeln, A. von. 1959. Über neue Arten der Gattungen *Synallaxis*, *Anabates* und *Xenops* in der kais. Ornithologischen Sammlung nebst auszungen aus Johann Natterer's nachgelassenen Notizen – Über die von ihm Brasilien gesammelten arten der subfamilien: Furnariinae und Synallaxinae. **Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien** 34:99-137.
- Pelzeln, A. von. 1871. **Zur Ornithologie brasiliens**: Resultate von Johann Natterers reisen in den Jahren 1817 bis 1835. Viena: A.Pichler's Witwe & Sohn. 462 pp + xx (Itinerarium, von Natterer's Reisen in Brasilien von 1817-1835).
- Pichorim, M. & Bornschein, M.R. 1993. Notas sobre *Streptoprocne biscutata* (Sclater, 1865) no estado do Paraná, sul do Brasil. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R22.
- Pichorim, M. & Bornschein, M.R. 2001. Primeiros registros de *Panyptila cayennensis* no Paraná e comentários sobre a suposta ocorrência de *Tachornis squamata* no estado (Apodidae). In: F.C.Straube ed. **Ornitologia sem fronteiras**, incluindo os Resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia (Curitiba,

- 22-27 de julho de 2001). Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. R157, p. 311-312.
- Pinto, O.M. de O. & Camargo, E.A. 1956. Lista anotada de aves colecionadas nos limites ocidentais do Estado do Paraná. **Papéis Avulsos do Departamento de Zoologia** 12(9):215-234.
- Pinto, O.M. de O. 1938. Catalogo das aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista: 1º parte, Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines excluída a Fam. Tyrannidae e seguintes. **Revista do Museu Paulista** 22:1-566.
- Pinto, O.M. de O. 1978. **Novo Catálogo das Aves do Brasil**: primeira parte: Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines, com exclusão da família Tyrannidae. São Paulo, Empr. Graf. Revista dos Tribunais. 446 pp.
- Raposo, M.A.; Parrine, R. & Filho (sic), M.C. 1994. Dois novos registros de aves para o Estado do Paraná. **IV Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos, p.49.
- Raposo, M.A.; Parrini, M. & Napoli, M. 1998. Taxonomia, morfometria e bioacústica do grupo específico *Hylophilus poicilotis/amaurocephalus* (Aves, Vireonidae). **Ararajuba** 6(2):87-109.
- Rodrigues, L.C.; Almeida, A.F. de; Kikuti, P. & Speltz, R.M. 1981. Estudo comparativo da avifauna em mata natural e em plantio homogêneo de *Araucaria angustifolia* (Bert.) O.Ktze. **IPEC, Circular Técnica** 132:1-7.
- Roos, A.L. & Piacentini, V. de Q. 2003. Revisão dos registros sul-brasileiros do gênero *Phoebetria* Reichenbach, 1853 e primeiro registro documentado de *Phoebetria palpebrata* (Forster, 1785) (Procellariiformes: Diomedidae) para Santa Catarina. **Ararajuba** 11(2):223-225
- Ruschi, A. 1982. **Beija-flores do Estado do Espírito Santo**. São Paulo, Editora Rios. 263 pp.
- Schubart, O.; Aguirre, A.A. & Sick, H. 1965. Contribuição para o conhecimento da alimentação das aves brasileiras. **Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo** 12:95-159.
- Scherer-Neto, P. 1980. **Aves do Paraná**. Nilópolis, Zoobotânica Mário Nardelli. 32 pp.
- Scherer-Neto, P. [1983]. **Lista de aves do Estado do Paraná**. Curitiba, Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte. Folheto, sanfonado com 14 páginas, n.p..

- Scherer-Neto, P. 1983. Avifauna do extinto Parque Nacional de 7 Quedas, Guaíra, estado do Paraná. **Arquivos de Biologia e Tecnologia** 26(4):488-494.
- Scherer-Neto, P. 1985a. **Lista de aves do Estado do Paraná**. Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba. Folheto, brochura com 13 p.; n.p.
- Scherer-Neto, P. 1985b. Nova ocorrência da "pomba-antártica" (*Chionis alba* Gmelin, 1789), no sul do Brasil. **Anais da Sociedade Sul-riograndense de Ornitologia** 6:19-20.
- Scherer-Neto, P.; Anjos, L.dos & Straube, F. 1994. Avifauna do Parque Estadual de Vila Velha, Estado do Paraná. **Arquivos de Biologia e Tecnologia** 37(1):223-229
- Scherer-Neto, P. & Carrano, E. 1998a. *Gampsonyx swainsoni* (Vigors, 1825) no Estado do Paraná. **Atualidades Ornitológicas** 82:2.
- Scherer-Neto, P. & Carrano, E. 1998b. Ocorrência da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) no Estado do Paraná. **Atualidades Ornitológicas** 82:11.
- Scherer-Neto, P. & Straube, F.C. 1995. **Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia**. Campo Largo, Logos Pess. 79 pp.
- Scherer-Neto, P.; Carrano, E. & Ribas, C.F. 2008a. Composição e conservação da avifauna da Estação Ecológica do Caiuá, noroeste do Paraná e regiões adjacentes. **Cadernos da Biodiversidade** 6(1):32-4
- Scherer-Neto, P.; Ramos, F.F. & Gonçalves, V. de P. 2008b. Registro documentado do pisa-na-água *Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819) no estado do Paraná, Brasil. **Atualidades Ornitológicas** 142:8.
- Scherer-Neto, P.; Straube, F.C. & Bornschein, M.R. 1991. Composição avifaunística dos cerrados do Estado do Paraná: levantamento e conservação. **I Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos p.15-16.
- Scherer-Neto, P.; Terto, A.C. & Carrano, E. 2009a. Ocorrência, ecologia e conservação de arara-vermelha-grande *Ara chloropterus* e arara-canindé *Ara ararauna* no estado do Paraná. **Cadernos de Biodiversidade** 6(2):22-29.
- Scherer-Neto, P.; Terto, A.C.; Ramos, F.F. & Lima, J.A.C. de. 2009b. Ocorrência de grandes bandos de aves aquáticas e limícolas no noroeste do estado do Paraná. **Atualidades Ornitológicas** 148:7-9.
- Seeger, C.; Lara, A.I.; Arruda, S.D.; Bócon, R.; Antonelli-Filho, R. & Scherer-Neto, P. 1993. Avifauna dos Refúgios Biológicos de

- Bela Vista e Santa Helena, Itaipu Binacional, oeste do Paraná. **III Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos P36.
- Simon, J.E.; Pacheco, J.F.; Mattos, G.T., Whitney, B.M. & Gagliardi, R.L. 2008. *Phacellodomus ferrugineigula* (Pelzeln, 1858) (Aves: Furnariidae) é uma espécie válida. **Revista Brasileira de Ornitologia**, 16(2): 107-124.
- Steffan, K. 1974. Vogelleben am Agua do Quati (Brasilien). **Gefiederte Welt** 98(6):102-104.
- Straube, F.C. 1989. Notas bionômicas sobre *Conopophaga melanops* (Vieillot, 1818) no Estado do Paraná. **Biotemas** 2(1):91-95.
- Straube, F.C. 1990a. Conservação de aves no litoral-sul do Estado do Paraná. **Arquivos de Biologia e Tecnologia** 33(1):159-173.
- Straube, F.C. 1990b. Notas sobre a distribuição de *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1837) e *Caprimulgus longirostris* longirostris Bonaparte, 1825 no Brasil (Aves; Caprimulgidae). **Acta Biologica Leopoldensia** 12(2):301-312.
- Straube, F.C. 2005. Fontes para o conhecimento da riqueza da avifauna do Estado do Paraná (Brasil): Ensaio comemorativo aos 25 anos do “Aves do Paraná” de Pedro Scherer Neto. **Atualidades Ornitológicas** 126 [resumo na pág. 15]; disponível on-line em URL: <http://www.ao.com.br/download/scherer2.pdf>
- Straube, F.C. & Bornschein, M.R. 1991a. Novos registros de *Chloroceryle inda* (Linnaeus, 1766) e *Chloroceryle aenea* (Pallas, 1764) para o Estado do Paraná, sul do Brasil (Alcedinidae, Aves). **Acta Biologica Leopoldensia** 13(1):81-84.
- Straube, F.C. & Bornschein, M.R.. 1991b. Notas sobre alguns Caprimulgiformes no Estado do Paraná (sul do Brasil). **Encuentro de Ornitología de Paraguay, Brasil y Argentina, Resúmenes**, p. 39.
- Straube, F.C. & Bornschein, M.R. 1991c. *Synallaxis hypospodia* Sclater, 1874: aspectos da bionomia e sucessão de plumagem. **I Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos, p.11.
- Straube, F.C. & Bornschein, M.R. 1991d. Novos registros de *Puffinus gravis* (O'Really, 1818) na costa brasileira (Procellariidae). **I Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R51, p.32-33.
- Straube, F.C. & Bornschein, M.R. 1995. New or noteworthy records of birds from northwestern Paraná and adjacent areas (Brazil). **Bulletin of the British Ornithologists' Club** 115(4):219-225.
- Straube, F.C.; Bornschein, M.R. & Scherer-Neto, P. 1996. Coletânea da avifauna da região noroeste do Estado do Paraná e áreas

- limítrofes (Brasil). **Arquivos de Biologia e Tecnologia** **39**(1):193-214.
- Straube, F.C.; Krul, R. & Carrano, E. 2005. Coletânea da avifauna da região sul do Paraná (Brasil). **Atualidades Ornitológicas** **125**.
- Straube, F.C. & Scherer-Neto, P. 1995. Novas observações sobre o "cunhataí" *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824) nos Estados do Paraná e São Paulo (Psittacidae, Aves). **Acta Biologica Leopoldensia** **17**(1):147-152.
- Straube, F.C.; Carrano, E.; Santos, R.E.F.; Scherer-Neto, P.; Ribas, C.F.; Meijer, A.A.R. de; Vallejos, M.A.V.; Lanzer, M.; Klemann-Júnior, L.; Aurélio-Silva, M.; Urben-Filho, A.; Arzua, M.; Lima, A.M.X. de; Sobânia, R.L.M.; Deconto, L.R.; Bispo, A.Â.; Jesus, S. de & Abilhôa, V. 2009. **Aves de Curitiba: coletânea de registros**. Curitiba, Hori Consultoria Ambiental e Prefeitura Municipal de Curitiba. 280 p.
- Straube, F.C. & Urben-Filho, A. 2001. Uma revisão crítica sobre o grau de conhecimento da avifauna do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná, Brasil) e áreas adjacentes. **Atualidades Ornitológicas** **118**, online.
- Straube, F.C. & Urben-Filho, A. 2005. Observações sobre a avifauna de pequenos remanescentes florestais na região noroeste do Paraná (Brasil). **Atualidades Ornitológicas** **123**, on line.
- Straube, F.C. & Urben-Filho, A. 2007. **Lista de campo: Aves da Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba, Paraná); Checklist: Birds of Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba, Paraná)**. Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
- Straube, F.C.; Urben-Filho, A. & Cândido-Jr., J.F. 2004. Novas informações sobre a avifauna do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná). **Atualidades Ornitológicas** **120**; on-line.
- Straube, F.C.; Urben-Filho, A.; Deconto, L.R. & Patrial, E.W. 2008. *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e sua expansão de distribuição geográfica pelo sul do Brasil. **Atualidades Ornitológicas** **137**:33-38.
- Straube, F.C.; Urben-Filho, A. & Gatto, C.A.F.R. 2005. A avifauna do Parque Estadual do Cerrado (Jaguariaíva, Paraná) e a conservação do cerrado em seu limite meridional de ocorrência. **Atualidades Ornitológicas** **128**, online.
- Straube, F.C.; Urben-Filho, A. & Kajiwarra, D. 2004. Aves. In (p.143-196): S.B.Mikich & R.S.Bérnils (Eds.), **Livro vermelho da**

- fauna ameaçada no Estado do Paraná.** Curitiba, Instituto Ambiental do Paraná.
- Straube, F.C.; Urben-Filho, A. & Piacentini, V. de Q. 2006. O beija-flor-tesoura *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) e sua ampliação de distribuição pelo sul do Brasil. **Atualidades Ornitológicas 132**; disponível on-line em <http://www.ao.com.br/download/tesoura.pdf>.
- Sztolcman, J. 1926. Étude des collections ornithologiques de Paraná. **Annales Zoologici Musei Polonici Historia Naturalis 5**:107-196.
- Temminck, C.J. 1824. [Volume 46, p. 275, fig.1] In: C.J.Temminck & M.L. de Chartrouse. **Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, pour servir de suite et de complement aux planches enluminées de Buffon.** Paris, F.G.Levrault.
- Uejima, A.M.K. & Bornschein, M.R. 2007. As aves dos Campos Gerais. In (p.109-121): M.S.Melo, R.S.Moro & G.B.Guimarães (Eds.). **Patrimônio Natural dos Campos Gerais do Paraná.** Ponta Grossa, UEPG. 227 pp.
- Urben-Filho, A.; Straube, F.C. & Gatto, C.A.F.R. 2001. Primeiro registro de *Chamaeza meruloides* para o Paraná. In: F.C.Straube ed. **Ornitologia sem fronteiras**, incluindo os Resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia (Curitiba, 22-27 de julho de 2001). Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. R2174, p. 381-382.
- Vallejos, M.A.V. & Deconto, L.R. 2009. Ocorrências extra-litorâneas de chimango *Milvago chimango* (Falconiformes: Falconidae) no Paraná. **Atualidades Ornitológicas 152**:39-40.
- Vallejos, M.A.V.; Molin, T.; Vieira-da-Rocha, M.C.; Deconto, L.R.; Floriano-Cunha, R.; Sobânia, R.L.M. & Scherer-Neto, P. (2009). Registro documentado da marreca-colhereira *Anas platalea* (Anseriformes: Anatidae) no Estado do Paraná. **Atualidades Ornitológicas 151**: 20-21.
- Westcott, P.W. 1980. Descrição das aves encontradas na área urbana de Londrina - Paraná. Primeira parte - espécies não Passeriformes. **Semina 6**(2):59-66.